

10 Znakova upozorenja

za otkrivanje primarne imunodeficijencije



Ako vi ili neko koga poznajete imate dva ili više od sljedećih znakova upozorenja, razgovarajte sa doktorom o eventualnom prisustvu neotkrivene primarne imunodeficijencije.



1 Četiri ili više novih upala uha tokom 1 godine.



2 Dvije ili više ozbiljnih upala sinusa tokom 1 godine.



5 Dijete zaostaje u rastu i tjelesnoj težini.



6 Ponavljajući duboki apsesi kože i unutrašnjih organa.



3 Dva ili više mjeseci na antibioticima sa slabim rezultatom.



7 Dugotrajne bjeličaste nasluge u ustima ili glijivične infekcije na koži.



4 Dvije ili više upala pluća tokom 1 godine.

8 Potreba za intravenskim antibioticima za liječenje infekcija.



9 Dvije ili više duboko smještenih infekcija, uključujući sepsu.

10 Porodična historija PID.

Primarne imunodeficijencije (PID) se javljaju češće nego što mislite.

Često, dolaze pod maskom drugih uobičajenih bolesti, od manjih infekcija do ozbiljnih slučajeva upale pluća. Iz tog razloga, Udruženja za PID preporučuju da svi pacijenti pogođeni sa dva ili više od nabrojanih 10 znakova upozorenja trebaju biti testirani na PID.



Ovi znakovi upozorenja su razvijeni od strane medicinskog savjetodavnog odbora Jeffrey Modell fondacije.

Udruženje "PID Bosna", rano dijagnosticiranje i obezbjeđivanje kvaliteta življenja osoba sa primarnim imunodeficijencijama Kranjčevićeva 37, 71000 Sarajevo, BIH, sa Jeffrey Modell istraživačkim i dijagnostičkim centrom za primarne imunodeficijencije na Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Sarajevo, Odjel alergoimunoreumatologije, Patriotske lige 81, 71000 Sarajevo, BIH

Tel.: +387 33 558 451

Fax.: +387 33 558 452

Email: pidbosnia@outlook.com