

Svako se razboli.





Ali, koliko često je prečesto?

Prepoznajte znakove primarne
imunodeficijencije.



10 Znakova upozorenja za otkrivanje primarne imunodeficijencije

Ako vi ili neko koga poznajete imate dva ili više od sljedećih znakova upozorenja, razgovarajte sa doktorom o eventualnom prisustvu neotkrivene primarne imunodeficijencije.


- 
- 
- 
- 
- 1** Četiri ili više novih upala uha tokom 1 godine.
- 2** Dvije ili više ozbiljnih upala sinusa tokom 1 godine.
- 3** Dva ili više mjeseci na antibioticima sa slabim rezultatom.
- 4** Dvije ili više upala pluća tokom 1 godine.
- 
- 
- 
- 
- 5** Dijete zaostaje u rastu i tjelesnoj težini.
- 6** Ponavljajući duboki apsesi kože i unutrašnjih organa.
- 7** Dugotrajne bjeličaste nasluge u ustima ili gljivične infekcije na koži.
- 8** Potreba za intravenskim antibioticima za liječenje infekcija.
- 
- 
- 9** Dvije ili više duboko smještenih infekcija, uključujući sepsu.
- 10** Porodična historija PID.

Primarne imunodeficijencije (PID) se javljaju češće nego što mislite. Često, dolaze pod maskom drugih uobičajenih bolesti, od manjih infekcija do ozbiljnih slučajeva upale pluća. Iz tog razloga, Udruženja za PID preporučuju da svi pacijenti pogodeni sa dva ili više od nabrojanih 10 znakova upozorenja trebaju biti testirani na PID.

jm Jeffrey Modell Foundation

octapharma
For the safe and optimal use of human proteins

Ovi znakovi upozorenja su razvijeni od strane medicinskog savjetodavnog odbora Jeffrey Modell fondacije.



jm Jeffrey Modell Foundation

octapharma

For the safe and optimal use of human proteins