

10 Предупредителни белега за първичен имунодефицит

Първичните имунодефицити (ПИД) при деца и възрастни се изявяват с чести и необичайно трудни за лечение инфекции. 1:500 индивида са засегнати от един от известните първични имунодефицити. Ако Вие или някой от Вашите познати е засегнат от два или повече от следните Предупредителни белези, говорете с лекар за възможното наличие на първичен имунодефицит.

- 1 Четири или повече ушни инфекции за 1 година.
- 2 Два или повече синусита за 1 година.
- 3 Два или повече месеца на антибиотици без ефект.
- 4 Две или повече пневмонии за 1 година.
- 5 По-бавно наддаване на тегло или забавен растеж на детето.
- 6 Повтарящи се дълбоки кожни или органни абсцеси.
- 7 Персистираща млечница или кожна гъбична инфекция.
- 8 Нужда от интравенозни антибиотици за лечение на инфекциите.
- 9 Две или повече дълбоки инфекции, включително септицемия.
- 10 Фамилна история на ПИД.

Реализирано с помощта на:



Curing PI.
Worldwide.



Съветване от Центровете за контрол и превенция на заболяванията, САЩ

National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)



PPTA
Plasma Protein Therapeutics Association



National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)



Baxter
BioScience

Blotest
From Nature for Life

CSL Behring
Biotherapies for Life™

GRIFOLS

KEDRION
BIOPHARMA

octapharma

Тези предупредителни белези са разработени от Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board.
Съветваме Ви да се консултирате с експерти по първични имунодефицити © 2013 Jeffrey Modell Foundation

За информация свържете се с Jeffrey Modell Foundation: info4pi.org | 866-INFO-4-PI