

10 znakova upozorenja za primarne imunodeficiencije

Primarne imunodeficiencije (PID) uzrokuju kod djece i odraslih ponavljane ili kronične infekcije koje je neobičajeno teško liječiti. Jedna od 500 osoba pogođena je nekom od primarnih imunodeficiencija.

Ako se u vas ili nekog koga poznajete jave dva ili više upozoravajuća znaka, savjetujte se sa liječnikom o mogućem postojanju primarne imunodeficiencije.

- 1** Četiri ili više upala srednjeg uha unutar jedne godine
- 2** Dvije ili više ozbiljne upale sinusa unutar jedne godine
- 3** Dva ili više mjeseca na terapiji antibioticima, a bez velikog učinka
- 4** Dvije ili više upale pluća unutar jedne godine
- 5** Nenapredovanje na tjelesnoj težini ili smetnje rasta
- 6** Ponavljani ili uporni duboki apscesi kože ili unutarnjih organa
- 7** Uporni mliječac (soor) ili gljivična infekcija kože
- 8** Potreba za intravenskim antibioticima kako bi se izliječila infekcija
- 9** Dvije ili više dubokih teških infekcija, uključujući sepsu
- 10** PID u obitelji



Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.



Grant 5H75DP225146-05



Plasma Protein Therapeutics Association



National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)



NATIONAL
CANCER
INSTITUTE



National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)



National Institute of
Child Health and Human
Development (NICHD)

These warning signs were developed by the Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board. Consultation with Primary Immunodeficiency experts is strongly suggested. © 2009 Jeffrey Modell Foundation

For information or referrals, contact the Jeffrey Modell Foundation: 866-INFO-4-PI | info4pi.org