


# علامت هشدار دهنده

وجود بیماری نقص ایمنی اولیه در بالغین



نقص ایمنی اولیه باعث بروز عفونت های تکرار شونده یا مقاوم به درمان در کودکان و بالغین مبتلا می گردد. از هر ۵۰۰ نفر یک نفر مبتلا به یکی از انواع شناخته شده نقص های ایمنی اولیه می باشد. اگر در شما یا بستگانتان دو یا بیش از دو علامت از علایم ده گانه زیر وجود دارد، حتما جهت بررسی از نظر احتمال وجود زمینه نقص ایمنی اولیه به پزشک مراجعه فرمایید.

۱. بروز ۲ بار یا بیشتر عفونت گوش در طی یک سال

۲. بروز ۲ بار یا بیشتر عفونت سینوس ها در طی یک سال (بدون وجود سابقه آلرژی در فرد)

۳. بروز ۱ نوبت عفونت ریوی (ذات الریه) در طی یک سال که حداقل برای دو سال تکرار گردد.

۴. اسهال مزمن به همراه کاهش وزن

۵. عفونت های مکرر ویروسی (از قبیل سرماخوردگی، تبخال، زگیل ها پوستی و تناسلی)

۶. نیاز مکرر به تزریق آنتی بیوتیک وریدی برای درمان عفونت ها

۷. آبسه های عمیق تکرار شونده در پوست یا سایر اعضای بدن

۸. بروز برفک مقاوم به درمان یا عفونت های قارچی در پوست یا سایر اعضای بدن

۹. بروز عفونت با میکروب هایی که در افراد طبیعی بیماریزان نیستند. (مانند باکتری های شبه سل)

۱۰. وجود فرد مبتلا به نقص ایمنی اولیه در خانواده

این علائم هشدار دهنده به عنوان خدمات عمومی توسط سازمان های زیر ارائه گردیده است:



Jeffrey Modell Foundation

Curing PI. Worldwide.



Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)



National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)



مرکز تحقیقات ایمنولوژی، آسم و آلرژی  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران



کرسی یونسکو در آموزش سلامت  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

علائم هشدار دهنده توسط هیئت مشاوره پزشکی در "بنیاد جفری مادل" تدوین گردیده است. این مطلب آموزشی توسط مرکز تحقیقات ایمنولوژی، آسم و آلرژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به فارسی ترجمه شده است.

اطلاعات تماس: تهران، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره ۳ طبقه ۴  
۶۶۹۰۷۴۱۵-۱۶

برای دریافت اطلاعات از طریق سایت مقابل به "بنیاد جفری مادل" مراجعه فرمایید: [info4pi.org](http://info4pi.org)