


علامت هشدار دهنده

وجود بیماری نقص ایمنی اولیه در کودکان



نقص ایمنی اولیه باعث بروز عفونت های تکرار شونده یا مقاوم به درمان در کودکان و بالغین مبتلا می گردد. از هر ۵۰۰ نفر یک نفر مبتلا به یکی از انواع شناخته شده نقص های ایمنی اولیه می باشد. اگر در شما یا بستگانتان دو یا بیش از دو علامت از علائم ده گانه زیر وجود دارد، حتما جهت بررسی از نظر احتمال وجود زمینه نقص ایمنی اولیه به پزشک مراجعه فرمایید.



۳ مصرف آنتی بیوتیک به مدت ۲ ماه یا بیشتر، بدون آنکه پاسخ درمانی مناسبی مشاهده شود.



۲ بروز ۲ بار یا بیشتر عفونت شدید سینوسها در طی یک سال



۱ بروز ۴ بار یا بیشتر عفونت گوش در طی یک سال



۷ آبسه های عمیق تکرار شونده در پوست یا سایر اعضای بدن



۵ مشکل جدی در وزن گرفتن شیرخوار یا اختلال رشد



۴ بروز ۲ بار یا بیشتر عفونت ریوی (ذات الریه) در طی یک سال



۹ بروز دوبار یا بیشتر عفونت های داخلی بدن مانند عفونت در استخوان ها، مغز، خون



۸ نیاز به تزریق آنتی بیوتیک وریدی برای درمان عفونت ها



۶ بروز برفک دهانی مقاوم به درمان یا عفونت های قارچی در پوست

این علائم هشدار دهنده به عنوان خدمات عمومی توسط سازمانهای زیر ارائه گردیده است:

Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



Curing PI. Worldwide.

Jeffrey Modell Foundation



علامت هشدار دهنده توسط هیئت مشاوره پزشکی در "بنیاد چفری مدل" تدوین گردیده است. این مطلب آموزشی توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به فارسی ترجمه شده است. اطلاعات تماس: تهران، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره ۳ طبقه ۴ ۶۶۹۰۷۴۱۵-۱۶

برای دریافت اطلاعات از طریق سایت مقابل به "بنیاد چفری مدل" مراجعه فرمایید: info4pi.org



۱۰ وجود فرد مبتلا به نقص ایمنی اولیه در خانواده

