10 figyelmeztető jel, amely primer immunhiányra utalhat

A veleszületett (primer) immunhiány (PI) gyakran kiújuló és/vagy nehezen gyógyítható fertőzéseket okoz gyermekekben és felnőttekben.

Az ismert primer immunhiányos állapotok előfordulása 1:500. Ha Ön vagy gyermeke, ismerőse egészségi állapotára az alább ismertetett figyelmeztető jelekből legalább kettő igaz, kérje háziorvosa segítségét az esetleges primer immunhiány betegség kivizsgálására vonatkozóan.

Két vagy több mély, szöveti fertőzés, szepszis.

Két vagy több súlyos homlok- vagy orrmelléküreg fertőzés egy éven belül.

Négy vagy több újonnan kialakuló fülgyulladás egy éven belül.





Makacs szájpenész vagy gombás bőrfertőzés.

Intravénás antibiotikum kezelés szükséges a fertőzések leküzdéséhez.

Visszatérő mély tályogok a bőrben vagy valamely szervben.

Legalább két tüdőgyulladás egy éven belül



A családban előfordult primer immunhiány.

Visszamaradt csecsemőkori súlygyarapodás vagy növekedés.

Két vagy több hónapos hatástalan antibiotikum-kezelés

Jeffrey Modell Foundation | Curing PI. Worldwide

KEDRION BIOPHARMA

These warning signs were developed by the Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board.Consultation with Primarts is strongly suggested. ©2013 Jeffrey Modell Foundation. For information or referrals, contact the Jeffrey Modell Foundation: info4pi.org

KEDRion 21/02/2014