

# Pirminio imunodeficito

# 10 įspėjamųjų ženklų

Jei Jūs ar kas nors iš Jūsų pažįstamų turite du ar daugiau žemiau išvardintų įspėjamųjų ženklų, pasikalbėkite su gydytoju apie galimą pirminio imunodeficito ligą.



**1** Keturios ar daugiau ausų infekcijų per vienerius metus.



**2** Dvi ar daugiau sunkių sinusų infekcijų per vienerius metus.



**3** Du ar daugiau mėnesių gydymo antibiotikais, be reikšmingo poveikio.



**4** Du ar daugiau plaučių uždegimų per vienerius metus.



**5** Kūdikiai sunkiai auga svoris, sutrikęs normalus vystymasis.



**6** Pasikartojantys, gilūs odos ar kitų organų abscesai.



**7** Pastoviai esanti burnos pienligė ar odos grybelinės infekcijos.



**8** Intraveninių antibiotikų poreikis infekcijos šalinimui.



**9** Dvi ar daugiau giliai organizme esančios infekcijos įskaitant kraujo užkrėtimą.



**10** Šeimoje yra sergančiųjų pirminiu imunodeficitu.

Pirminiu imunodeficitu sergama dažniau nei Jūs manote. Neretai ši liga maskuojasi kitais susirgimais, pasireiškiančiais nuo lengvų infekcijų iki sunkių plaučių uždegimų. Todėl rekomenduojama visiems, kurie turi du ar daugiau iš 10 išvardintų požymių, išsitiirti dėl pirminio imunodeficito.

**jm** Jeffrey Modell Foundation

Šie PID požymiai parengti Jeffrey Modell Foundation Medicinos tarybos.

