

10

FOR GENERAL

Sepuluh tanda amaran Penyakit Immunodefisiensi Primer

Penyakit immunodefisiensi primer menyebabkan kanak-kanak dan orang dewasa diserang infeksi secara berulang-ulang atau infeksi yang susah untuk diubati. 1:500 orang mempunyai penyakit immunodefisiensi primer. Sekiranya kamu atau orang yang dikenali mempunyai dua atau lebih daripada tanda-tanda amaran berikut, sila berhubung dengan doktor untuk mengenal pasti sama ada tanda-tanda tersebut merupakan manifestasi penyakit immunodefisiensi primer.

- 1 4 atau lebih infeksi telinga dalam setahun.
- 2 Dua atau lebih infeksi hidung dalam setahun.
- 3 Di bawah regimen antibiotic yang tidak berkesan selama dua bulan atau lebih.
- 4 Dua atau lebih infeksi paru-paru dalam setahun.
- 5 Bayi yang tiada peningkatan berat badan atau tumbesaran yang biasa.
- 6 Keadaan kulit atau organ yang bernanah secara berulang.
- 7 Seriawan atau infeksi kulat kulit yang berterusan.
- 8 Keperluan mengambil antibiotik secara intravena.
- 9 Dua atau lebih infeksi dalaman termasuklah infeksi yang melibatkan seluruh badan.
- 10 Kewujudan PI dalam keturunan keluarga.

Presented as a public service by:



Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.



Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)



Plasma Protein Therapeutics Association



National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)



National Institute of Child Health
& Human Development

Baxter
BioScience

Biotest
From Nature for Life

CSL Behring
Biotherapies for Life™

GRIFOLS

KEDRION
BIOPHARMA

octapharma

These warning signs were developed by the Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board.
Consultation with Primary Immunodeficiency experts is strongly suggested. © 2013 Jeffrey Modell Foundation

For information or referrals, contact the Jeffrey Modell Foundation: info4pi.org | 866-INFO-4-PI