

Настораживающие признаки первичного иммунодефицита у детей



**Четыре или более обострения
отита в течение года**

**Рецидивирующие глубокие
абсцессы кожи или органов**



**Два или более тяжелых
синусита в течение года**

**Персистирующая молочница
или грибковые инфекции кожи**



**Потребность в а/б терапии
в течение 2 и более месяцев
с минимальным эффектом**

**Повторяющаяся потребность
во внутривенной а/б
терапии для лечения инфекций**



**Две или более пневмонии
в течение года**

**Две и более
генерализованных
инфекции, включая сепсис**



**Плохая прибавка младенцев
в весе и росте, осложнения при
вакцинации живыми вакцинами**

**Наличие в семейном анамнезе
первичных иммунодефицитов**




Настораживающие признаки первичного иммунодефицита у взрослых



Два или более обострения
отита в течение года

Рецидивирующие глубокие
абсцессы кожи или органов



Два или более обострения
синусита в течение года
(в условиях отсутствия аллергии)

Персистирующий кандидоз
или грибковые инфекции кожи




Одна пневмония ежегодно в
течение нескольких лет

Потребность
во внутривенной а/б
терапии для лечения инфекций



Хроническая диарея с потерей веса

Инфекция, вызванная атипичными
микобактериями



Повторные вирусные инфекции
(ОРЗ, герпес, бородавки,
кандиломы)

Наличие в семейном анамнезе
первичных иммунодефицитов