

10 ПРИЗНАКОВ

ПЕРВИЧНОЙ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ



1

Более чем 4 случая отита в год для детей или 2 случая отита в год для взрослых



2

Два и более случаев синусита в год



3

Два и более месяцев малоэффективного лечения антибиотиками



4

Два или более случаев воспаления легких в год или один случай воспаления легких в год в течении 2 лет подряд



5

Недостаточная прибавка в росте и весе или хроническая диарея с потерей веса



6

Повторные глубокие абсцессы кожи или внутренних органов



7

Постоянная молочница во рту или грибковые заболевания кожи /повторные вирусные инфекции



8

Повторная необходимость лечить инфекции антибиотиками внутривенно



9

Инфекции с атипичными микобактериями / два и более случаев инвазивной инфекции



10

Случаи иммунной недостаточности в семье

Автор иллюстраций: Елена Корчинская

Последствием первичной иммунной недостаточности являются частые и тяжелоизлечимые инфекционные болезни. Частота проявления первичной иммунной недостаточности 1:500. Если у Вас или Ваших знакомых проявляются 2 или более признаков из нижеперечисленного списка, то следует связаться с врачом, чтобы выяснить вероятность наличия иммунной недостаточности.

