

10 Настораживающих Признаков первичного иммунодефицита

Первичный иммунодефицит (ПИД) встречается у детей и взрослых и приводит к возникновению инфекций, которые часто рецидивируют или необычайно трудно поддаются лечению.

1: 500 человек страдает от одной из известных форм первичного иммунодефицита.

Если у Вас или у кого – то из Вашего окружения имеются два или более из перечисленных ниже настораживающих признаков, следует обсудить с врачом возможность дальнейшего обследования на предмет выявления первичного иммунодефицита.

- 1** Четыре или более острых отитов в течение года.
- 2** Два или более тяжелых синуситов в течение года.
- 3** Длительная, два месяца и более, антибиотикотерапия с минимальным эффектом.
- 4** Две или более пневмоний в течение года.
- 5** Неспособность ребенка раннего возраста нормально прибавлять в весе и росте.
- 6** Повторные глубокие абсцессы кожи или внутренних органов.
- 7** Стойкая молочница полости рта или грибковая инфекция кожи.
- 8** Необходимость внутривенного введения антибиотиков для лечения инфекций.
- 9** Две или более глубоких инфекций, включая септицемию.
- 10** Наличие диагноза ПИД в семье.

Представлено для общественного использования благодаря:



Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.



Grant 5H75DP225146-05



Plasma Protein Therapeutics Association



National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)



NATIONAL
CANCER
INSTITUTE



National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)



National Institute of
Child Health and Human
Development (NICHD)

Эта информация разработана комиссией медицинских экспертов Jeffrey Modell Foundation
Настоятельно советуем пройти консультацию у специалистов по диагностике и лечению Первичных Иммунодефицитов.
© 2009 Jeffrey Modell Foundation

Для получения информации или корреспонденции обращайтесь в Jeffrey Modell Foundation | 866-INFO-4-PI info4pi.org