



ZNAKOVA UPOZORENJA ZA PRIMARNU IMUNODEFICIJENCIJU

Primarna imunodeficijencija (PID) kod dece i odraslih dovodi do čestih, ponovljenih infekcija, koje se obično teško leče.

Nepoznavanje simptoma i neprepoznavanje znakova upozorenja dovode do toga da većina osoba sa urođenim poremećajem imuniteta u Evropi nije dijagnostikovana. Zbog toga su pacijenti i njihovi roditelji izloženi patnji i brizi, a njihovo lečenje košta neopravdano mnogo. Ako Vi ili neko koga poznajete ima bar **DVA** od navedinih znakova upozorenja, razgovarajte sa lekarom i uzmite u obzir Primarnu imunodeficijenciju.

1 Četiri i više ponovljenih infekcija srednjeg uha godišnje

Ponovljeni gnojni procesi na koži ili drugim organima

6

2 Dve ozbiljne upale sinusa godišnje, ili više

Konstantna gljivična infekcija u ustima ili na koži posle prve godine

7

3 Dva meseca i duže pod antibioticima, bez rezultata

Korišćenje intravenskih antibiotika u lečenju infekcije

8

4 Dve pneumonije godišnje ili više

Najmanje dve ozbiljne infekcije uključujući i sepsu

9

5 Slabo napredovanje deteta u težini i visini

Porodična istorija opterećena primarnom imunodeficijencijom

10

Kako se PID leči?

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva, čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenata i porodica. Za neke vrste primarnih imunodeficijencija je potrebna terapija imunoglobulinima, a primena gama interferona, PEG-ADA i interleukina pomaže kod komplikovanih vrsta poremećaja. Presađivanje kostne srži i genska terapija mogu da pomognu kod izuzetno teških oblika.

Kako se živi sa PID?

Mada je situacija sve bolja, porodice i pacijenti sa PID nailaze na različite teškoće; posle mirnog perioda bez infekcija, nastaju nagla pogoršanja, sa upalom pluća; pacijent je prinuđen da se leči ozbiljno i uz visoki rizik. Bolest zastrašuje a neuspostavljanje dijagnoze stvara osećaj nemoći, iščekivanja „sledećeg napada“ i produžene neizvesnosti. Slaba svest i nedostatak znanja o ovim poremećajima pacijenta vodi u izolaciju, javno obraćanje nije prijatno, lečenje je često veoma skupo – sve to dodatno otežava situaciju.



Podrška Osobama s Primarnim Imunodeficitima

Adresa: Srbija; 11070 Novi Beograd; Otona Župančića 12/38; Tel: +381 11 2 60 20 30
www.pospid.rs

octapharma

For the safe and optimal use of human proteins



Curing Pl. Worldwide.