


10 varovných príznakov primárnej imunodeficiencie

Primárne imunodeficiencie spôsobujú u detí a dospelých infekcie, ktoré sa často opakujú alebo sa neobvykle ťažko liečia. Jednou zo známych primárnych imunodeficiencií je postihnutý 1 z 500 ľudí. V prípade, že vy alebo niekto koho poznáte, má dva alebo viac z týchto varovných príznakov, obráťte sa na lekára ohľadne vyšetrenia na možnú primárnu imunodeficienciu.



1 Štyri a viac nových ušných infekcií v priebehu jedného roka.



2 Dve alebo viac závažných infekcií prínosových dutín v priebehu roka.



3 Dva mesiace a dlhšie trvajúca antibiotická liečba s malým účinkom.



4 Dva alebo viac zápalov pľúc v priebehu jedného roka.




5 Neprospievanie dojčiat a zaostávanie v normálnom raste.



6 Opakujúce sa hlboké kožné alebo orgánové abscesy.



7 Pretrvávajúca kandidóza v ústach alebo plesňové kožné infekcie.



8 Potreba vnútrožilového podávania antibiotík na zvládnutie infekcií.



9 Dve alebo viac závažných infekcií, vrátane septikémie.



10 Výskyt primárnej imunodeficiencie v rodine.

Pripravené ako služba verejnosti týmito subjektami:



Jeffrey Modell Foundation | Curing PI Worldwide.



Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



Tento informačný materiál bol vytvorený Medicínskym kolégiom nadácie Jeffrey Modell Foundation. Údaje v ňom obsiahnuté odporúčame konzultovať s odborníkom na liečbu primárnych imunodeficiencií. © 2013 Jeffrey Modell Foundation

Ďalšie informácie a odkazy nájdete na stránke Jeffrey Modell Foundation: www.info4pi.org a na stránke Zdrúženia pacientov s primárnou imunodeficienciou www.imunodeficit.sk.