

# 10 VAROVNÝCH PRÍZNAKOV primárnej imunodeficiencie

Primárne imunodeficiencie (PI) spôsobujú u detí a dospelých infekcie, ktoré sa často opakujú alebo sú neobvykle ťažko liečiteľné. Jeden z 500 ľudí je postihnutý jednou zo známych primárnych imunodeficiencií. **V prípade, že vy alebo niekto, koho poznáte, má dva alebo viac z uvedených varovných príznakov, obráťte sa na lekára ohľadne vyšetrenia na možnú primárnu imunodeficienciu.**

1. Štyri a viac nových ušných infekcií v priebehu 1 roka
2. Dve alebo viac závažných infekcií prínosových dutín v priebehu 1 roka
3. Dva alebo viac mesiacov liečby antibiotikami s malým účinkom
4. Dva alebo viac zápalov pľúc v priebehu 1 roka
5. Neprospievanie dojčťa a zaostávanie v normálnom raste
6. Opakujúce sa hlboké kožné alebo orgánové abscesy
7. Pretrvávajúce afty v dutine ústnej alebo plesňové infekcie na koži
8. Potreba vnútrožilového podávania antibiotík na zvládnutie infekcií
9. Dve alebo viac hlbokých infekcií, vrátane septikémie
10. Rodinný výskyt vrodenej imunodeficiencie

Presented as a public service by:



Jeffrey Modell  
Foundation

Curing PI.  
Worldwide.



Funding was made possible in part by grant 5H75DP225146-05 from the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



National Heart,  
Lung, and Blood  
Institute (NHLBI)



National Institute of  
Allergy and Infectious  
Diseases (NIAID)



National Institute of  
Child Health and Human  
Development (NICHD)

**Baxter**  
BioScience

**CSL Behring**  
Biotherapies for Life™

**GRIFOLS**

**octapharma**

**PPTA**  
Plasma Protein Therapeutics Association

**Talecris**  
BIOTHERAPEUTICS

Varovné príznaky boli vypracované Medicínskym poradným zborom Nadácie Jeffrey Modella. Odporúča sa, aby ste v prípade potreby konzultovali špecialistu na primárne imunodeficiencie. Pre informácie a ďalšie usmernenie kontaktujte Jeffrey Modell Nadáciu: [www.info4pi.org](http://www.info4pi.org)