

Känn igen varningstecknen för primär immunbrist!

Cirka 3 000 personer i Sverige har diagnosen primär immunbrist. Mörkertalet beräknas dock vara stort. Cirka 40 000 personer kan ha en avvikelse i sitt immunförsvar. Flertalet har en relativt mild form av immunbrist, men upp mot 5 000 personer beräknas behöva medicinsk behandling. Enkla verktyg kan minska mörkertalet.

Att ha en primär immunbrist innebär att man har ett medfött fel eller en brist i sitt immunförsvar. Personer med primär immunbrist drabbas som regel lättare av infektioner. Infektionerna är ofta återkommande och långdragna, i vissa fall livshotande.

Primär immunbrist är ett samlingsnamn på över 200 olika sjukdomar. Sjukdomarna är medfödda och genetiskt betingade. Symtom kan visa sig redan vid födseln eller senare i livet. De flesta personer med primär immunbrist kan få lindring med rätt behandling.

Mer information finns hos Primär immunbrist organisationen www.pio.nu

Varningstecken hos VUXNA

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken, bör utredning avseende nedsättning av immunförsvaret övervägas:

- 1 Fyra eller fler luftvägsinfektioner per år under 2-3 år. Infektionerna drabbar oftast öron, bihålor, luftrör samt lungor. Infektionerna ska ha krävt behandling med antibiotika.
- 2 Dålig effekt, utebliven effekt eller upprepade återfall vid behandling med antibiotika.
- 3 Två eller fler svåra infektioner orsakade av bakterier, såsom benröta, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning eller infektioner i kroppens mjukdelar.
- 4 Två eller fler bihåle- eller lunginflammationer under en treårsperiod. Infektionerna ska ha påvisats med röntgenundersökning.
- 5 Infektioner på ovanliga ställen i kroppen och/eller infektioner som är orsakade av ovanliga smittämnen.
- 6 Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

10 varningstecken hos BARN

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken, bör utredning avseende nedsättning av immunförsvaret övervägas:



1. Sex eller fler öroninflammationer per år. Öroninflammation med åtföljande hål i trumhinnan eller inflammation i klippbenets utskott bakom örat (mastoidit).



2. Två eller fler bihåleinflammationer per år.



3. Infektioner som inte läker på förväntat sätt under antibiotikabehandling.



4. Två eller fler lunginflammationer per år.



5. Dålig längd-/viktökning hos spädbarn.



6. Återkommande infektioner som t ex varbölder i hud och/eller andra organ.



7. Långvarig uttalad svampinfektion i munhålan (muntorsk) eller på huden.



8. Infektioner på ovanliga ställen i kroppen och/eller infektioner som är orsakade av ovanliga smittämnen.



9. Två eller fler djupgående infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit), benröta eller blodförgiftning.



10. Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

Verktyg för diagnos, utredning och behandling av primär immunbrist finns på www.slipi.nu

PIO med samarbetspartners



octapharma

Baxter

CSL Behring
Biotherapies for Life™



Steripolar