



## De 10 varningstecknen på primär immunbrist

Primär (medfödd) immunbrist (PID) förorsakar täta och svårbehandlade infektioner hos barn och vuxna. I Sverige har antalet personer med PID uppskattats till omkring 40.000. Det finns ett 80-tal hittills definierade sjukdomar av det här slaget.

Om mer än ett av följande besvär stämmer in på dig eller ditt barn, tala med din läkare om att utreda eventuell PID.

Åtta eller fler öroninflammationer per år.

Två eller fler allvarliga bihåleinflammationer per år.

Två eller fler månaders antibiotikabehandling med dålig effekt.

Två eller fler lunginflammationer per år.

Dålig viktökning hos barn.

Upprepade djupa svårläkta sår i hud eller organ.

Ihållande torsk (svamp) i mun eller på huden efter ett-årsåldern.

Behov av intravenös tillförsel av antibiotika för att klara av infektioner.

Två eller fler djupgående infektioner såsom meningit, benröta, bindvävsinfektion eller blodförgiftning.

Familjebakgrund med PID.

Fastän de medfödda immunbristerna kan vara allvarliga, är de sällan livshotande och kan i allmänhet kontrolleras. Primär immunbrist skall inte sammanblandas med AIDS. Primär immunbrist kan diagnostiseras genom blodprover och måste upptäckas så snart som möjligt för att undvika bestående skador.

**För mer information:** PIO, Primär Immunbrist Organisationen, Kerstin Torstenson, Box 12053, 40241 Göteborg, tel 031-854674, fax 031-145976 eller PIO, Ann-Sofie Isaksson, Långa Raden 5B, 983 32 Malmberget, tel/fax 0970-25254 SWEDISH

*Översättning av "The 10 Warning Signs of Primary Immune Deficiency" utarbetad av The Jeffrey Modell Foundation, inc och Amerikanska Röda korset. En anpassning till svenska förhållanden har gjorts.*