

10

WAARSCHUWINGSTEKENS VOOR PRIMAIRE IMMUNDEFICIËNTIE BIJ KINDEREN

Primaire immunodeficiënties (PID) leiden typisch tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties die frequent terugkeren of moeilijk te behandelen zijn. **Indien u twee of meer van deze waarschuwingstekens herkent, praat er dan over met uw huisarts.**



1

Vier of meer
nieuwe
oorontstekingen
in de loop van
één jaar



2

Twee of meer
nieuwe ernstige
sinusontstekingen
in de loop van
één jaar



3

Twee of meer
maanden
antibioticatherapie
zonder
veel effect



4

Twee of meer
longontstekingen
in de loop van
één jaar



5

Groeiachterstand
in lengte of
gewicht bij
een kind



6

Herhaalde
diepe abscessen
van de huid
of inwendige
organen zoals
de lever



7

Aanhoudende
spruw (candida)
in de mond of
schimmelinfectie
ter hoogte van de
huid of elders



8

Nood aan
intraveneuze
antibiotica om
een infectie te
genezen



9

Twee of meer
invasieve infecties
(bv. infectie van
het bloed met een
bacterie, hersen-
vliesontsteking)



10

Een
voorgeschiedenis
van PID in
de familie

De eerste evaluatie in de diagnose van een primaire immunodeficiëntie omvat:

- Lichamelijk onderzoek (incl. lengte en gewicht) en familiale voorgeschiedenis
- Hemogram inclusief witte bloedceldifferentiatie
- Dosage van immunoglobulines: IgG, IgM en IgA (te vergelijken met de leeftijdsspecifieke waarden)

Deze waarschuwingstekens en de vier verschillende stappen in de diagnose van een primaire immunodeficiëntie werden ontwikkeld door de Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board (www.info4pi.org). Verwijzing van de patiënt naar een expert in primaire immunodeficiëntie wordt ten zeerste aanbevolen (www.bpidg.org).