

10

პირველადი იმუნოდეფიციტის გამაფრთხილებელი ნიშანი

პირველადი იმუნოდეფიციტი (PI) ბავშვებსა და ზრდასრულებში იწვევს ისეთ ინფექციებს, რომლებიც ხშირად მეორდება ან რთულია სამკურნალოდ. 1:500 ადამიანს აღენიშნება პირველადი იმუნოდეფიციტის რომელიმე ცნობილი ფორმა. თუ თქვენ ან თქვენს ნაცნობს აქვს ჩამოთვლილიდან 2 ან მეტი გამაფრთხილებელი ნიშანი, გაესაუბრეთ ექიმს პირველადი იმუნოდეფიციტის შესაძლო არსებობაზე.

- 1 ყურის ოთხი ან მეტი ახალი ინფექცია ერთი წლის განმავლობაში.
- 2 ორი ან მეტი სერიოზული სინუსური ინფექცია ერთი წლის განმავლობაში.
- 3 ანტიბიოტიკების მოხმარება 1 ან 2 თვე მცირე ეფექტით ან უშედეგოდ.
- 4 ორი ან მეტი პნევმონია ერთი წლის განმავლობაში.
- 5 წონის მატების ან ზრდის პრობლემა ჩვილებში.
- 6 კანის ან სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა, განმეორებითი აბსცესები.
- 7 მუდმივი ნადები პირში ან სოკოვანი ინფექცია კანზე.
- 8 ინტრავენური ანტიბიოტიკების ხშირი საჭიროება ინფექციების სამკურნალოდ.
- 9 ორი ან მეტი გახანგრძლივებული ინექცია სეპტიცემიის ჩათვლით.
- 10 პირველადი იმუნოდეფიციტის ოჯახური ისტორია.

საჯარო სერვისის მომწოდებლები:



Jeffrey Modell Foundation

Curing PI. Worldwide.



Funding was made possible in part by a grant from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)



PPTA
Plasma Protein Therapeutics Association



National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)



NICHD
National Institute of Child Health & Human Development



ეს გამაფრთხილებელი ნიშნები შემუშავდა Jeffrey Modell Foundation-ის სამედიცინო სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ.

მკვეთრად რეკომენდებულია კონსულტაცია პირველადი იმუნოდეფიციტის ექსპერტებთან © 2024 Jeffrey Modell Foundation

ინფორმაციისთვის ან მიმართვისთვის დაუკავშირდით Jeffrey Modell Foundation-ს: info4pi.org