

# 10

FYRIR FULLORÐNA

## Hættumerki um meðfædda ónæmisgalla

Meðfæddir ónæmisgallar valda endurteknum sýkingum hjá börnum og fullorðnum sem einnig reynast oft erfiðar í meðhöndlun. Ef þú eða einhver sem þú þekkir sýnir tvö eða fleiri eftirtalinn hættumerkja, skaltu ræða við lækni um hugsanlegan meðfæddan ónæmisgalla.

- 1 Eyrnabólga tvisar sinnum eða oftár undanfarið ár.
- 2 Tvær eða fleiri nýjar kinnholusýkingar undanfarið ár án þess að um ofnæmi sé að ræða.
- 3 Lungnabólga einu sinni á ári í fleiri en 2 ár í röð.
- 4 Viðverandi niðurgangur og minnkandi líkamsþyngd.
- 5 Endurteknar veirusýkingar (kvef, frunsur, vörtur, kynfæravörtur).
- 6 Endurtekin þörf fyrir sýklalyf í æð til meðhöndlunar á sýkingum.
- 7 Endurtekin, djúp graftarkýli í húð eða í innri líffærum.
- 8 Viðvarandi þruska eða sveppasýking í húð eða annars staðar.
- 9 Sýking af annars meinlausri berklaskyldri bakteríu.
- 10 Fjölskyldusaga um meðfædda ónæmisgalla.



# BÆKLINGAR & FRÓÐLEIKUR

WWW.LINDISLAND.NET

ÞÚ FINNUR  
FRÓÐLEGAR  
UPPLÝSINGAR UM  
FÉLAGIÐ OG  
STARFSEMINA INN  
Á VEF OKKAR



Jeffrey Modell  
Foundation




ÞÚ FINNUR OKKUR  
Á FACEBOOK

FACEBOOK.COM/LINDISLAND.NET



# 10 Hættumerki um meðfædda ónæmisgalla

LIND FÉLAG UM MEÐFÆDDA ÓNÆMISGALLA



MYNSKREYTT  
FYRIR YNGRI KYNSLÓÐINA



Eyrnabólga fjórum sinnum eða oftár undanfarið ár.

