

Uputa o lijeku: informacije za korisnika

Aknet 10 mg/ml otopina za kožu

klindamicin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Aknet i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Aknet?
3. Kako primjenjivati Aknet?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Aknet?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Aknet i za što se koristi?

Aknet spada u skupinu lijekova za liječenje akni. Sadrži djelatnu tvar klindamicin koja je antibiotik te djeluje na način da sprječava rast osjetljivih bakterija.

Aknet se primjenjuje u liječenju upalno promijenjenih akni (*acne vulgaris*). Primjena lijeka osobito je učinkovita u slučaju blagih i umjerenih akni, poput akni tijekom puberteta i rane adolescencije te akni u odraslih žena.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Aknet?

Nemojte primjenjivati Aknet

- ako ste alergični na klindamicin, linkomicin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako u povijesti bolesti imate upalne bolesti crijeva (Chronova bolest, ulcerozni kolitis) ili upalu crijeva povezanu s primjenom antibiotika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Aknet.

Prije primjene Aknet otopine za kožu obavijestite liječnika o svim zdravstvenim problemima koje imate ili ste prije imali, kao i o svim alergijama.

Aknet treba s oprezom primjenjivati ako ste skloni alergijama.

Prije primjene ovog lijeka obavijestite Vašeg liječnika ako imate proljev ili u pravilu dobivate proljev kod primjene antibiotika. Ako tijekom primjene Aknet otopine za kožu razvijete ozbiljan ili produžen ili krvav proljev odmah obavijestite Vašeg liječnika jer će se u tom slučaju prekinuti liječenje. To može biti znak upale crijeva (pseudomembranozni kolitis) koji se može pojaviti uz primjenu antibiotika.

Lokalna primjena klindamicina može uzrokovati rast neosjetljivih mikroorganizama (pojava gram-negativne infekcije kože, folikulitisa). Stoga se javite Vašem liječniku, ako dođe do pojave dodatne infekcije tijekom liječenja klindamicinom, jer primjenu lijeka u tom slučaju treba obustaviti i započeti primjereno liječenje.

Dodatan je oprez potreban pri primjeni otopine u blizini usta i drugih sluznica te oštećene kože. Ako dođe do kontakta s navedenim površinama, treba ih isprati hladnom vodom.

Drugi lijekovi i Aknet

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Prije primjene ovog lijeka obavijestite Vašeg liječnika:

- ako koristite druge preparate za liječenje akni što sadrže tvari koje će izazvati ljuštenje, razmekšavanje ili abraziju kože (npr. benzoil peroksid, tretinoin, rezorcinol, salicilnu kiselinu, sumpor). Ne preporučuje se istodobna primjena s klindamicinom zbog mogućeg kumulativnog nadražujućeg učinka na kožu.
- ako uzimate eritromicin (antibiotik). Istodobno ne bi trebalo koristiti klindamicin i eritromicin.
- ako uzimate lijekove iz skupine neuromuskularnih blokatora (lijekovi za opuštanje mišića tijekom anestezije, elektrošokova ili konvulzija). Klindamicin može pojačati učinak ovih lijekova.
- ako uzimate varfarin ili slične lijekove koji se koriste za sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka. Možete imati veći rizik od krvarenja. Liječnik Vam može redovito provoditi krvne pretrage da provjeri kako Vam se zgrušava krv.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Aknet otopina za kožu smije se koristiti tijekom trudnoće samo ako Vaš liječnik smatra da je to neophodno.

Dojenje

Obavijestite Vašeg liječnika ako dojite za vrijeme primjene Aknet otopine za kožu jer se klindamicin može izlučiti u majčino mlijeko. Vaš liječnik će odlučiti je li ovaj lijek primjeren Vama. Premda nije vjerojatno da će dojenče putem majčinog mlijeka unijeti puno klindamicina, ako primijetite u dojenčeta krvavi proljev ili ako pokaže bilo kakav znak bolesti, odmah obavijestite Vašeg liječnika. Trebali biste u tom slučaju prekinuti s dojenjem.

Upravljanje vozilima i strojevima

Aknet otopina za kožu ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Aknet sadrži propilenglikol

Aknet sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.

3. Kako primjenjivati Aknet?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni .

Aknet otopina za kožu nanosi se u tankom sloju na zahvaćeno područje prethodno oprane i očišćene kože, dva puta na dan.

Poboljšanje najčešće nastupa za otprilike 6 tjedana u većine bolesnika (početno poboljšanje nakon 2 tjedna, a maksimalna učinkovitost nakon 12 tjedana).

Liječenje se provodi do željenog odgovora, a bez javljanja nuspojava.

Ako imate osjećaj da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Ako ste primijenili više Akneta nego što ste trebali

Obavijestite Vašeg liječnika. Ne primjenjujte više Aknet otopine za kožu nego što Vam je liječnik propisao.

Ako progutate Aknet

Odmah se obratite liječniku ako Vi ili netko drugi slučajno progutate Aknet otopinu za kožu.

Ako ste zaboravili primijeniti Aknet

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Primijenite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete primjenjivati Aknet

Ako prestanete primjenjivati lijek prije vremena, mogu Vam se simptomi ponovno javiti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Nuspojave su navedene s obzirom na njihovu učestalost.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- suha koža

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- crvenilo, lokalna iritacija kože, ljuštenje kože, masna koža, svrbež i pečenje kože
- mučnina, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu, grčevi
- alergijske reakcije uključuju kontaktni dermatitis, svrbež kože

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- upala korijena dlake (folikulitis) uzrokovan gram negativnim bakterijama

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- crijevna upala (pseudomembranozni kolitis)
- neuromišićna blokada

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Aknet?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je otisnut na pakiranju iza oznake EXP.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Aknet sadrži?

Djelatna tvar je klindamicin. 1 ml otopine sadrži 10 mg klindamicina u obliku klindamicinklorida.

Pomoćne tvari su: etanol 96%-tni, propilenglikol (E1520), pročišćena voda.

Kako Aknet izgleda i sadržaj pakiranja?

Bistra, bezbojna otopina mirisa na etanol.

30 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici s kapaljkom i plastičnim zatvaračem (PE) na navoj, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 03. ožujka 2021.