

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Carbomed 385 mg/g granule za oralnu suspenziju

aktivirani ugljen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Carbomed granule i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Carbomed granule?
3. Kako uzimati Carbomed granule?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Carbomed granule?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Carbomed granule i za što se koriste?

Djelatna tvar u Carbomed granulama je aktivirani medicinski ugljen. Pripada skupini lijekova koji se zovu crijevni adsorbensi. Aktivirani medicinski ugljen djeluje tako što na svoju površinu privlači i zadržava (adsorbira) lijekove i otrovne tvari. Na taj način smanjuje se ulazak nepoželjnih tvari iz probavnog sustava u krvotok i pomaže njihovo odstranjenje iz organizma.

Carbomed granule koriste se za liječenje akutnog trovanja ili predoziranja unesenim otrovom ili lijekom na usta te kod trovanja hranom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Carbomed granule?

Nemojte uzimati Carbomed granule

- ako ste alergični na aktivirani ugljen ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
- ako postoji mogućnost oralne primjene protuotrova na uzrok trovanja ili predoziranja.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Carbomed granule.

Primjena ovog lijeka ne preporučuje se u slučajevima trovanja mineralnim kiselinama ili lužinama, sredstvima za pranje, odnosno solima teških metala, cijanidom, metanolom, alkoholom (etanolom) ili antifrizom (etilen glikolom) jer navedene tvari aktivirani medicinski ugljen slabo veže (adsorbira).

Usporedno liječenje Carbomed granulama i oralnim lijekom koji izaziva povraćanje (emetik) ili protuotrovom smanjuje djelovanje emetika ili protuotrova.

Osoba kojoj se daje suspenzija aktiviranog medicinskog ugljena mora biti pri svijesti. Tijekom primjene suspenzije Carbomed granula potrebno je paziti da ne dođe do udisanja čestica aktiviranog

ugljena. Suspenziju bolesniku koji je bez svijesti smije dati samo zdravstveni radnik pod posebnim uvjetima.

Dugotrajno liječenje aktiviranim medicinskim ugljenom može izazvati probavne poremećaje zbog vezanja enzima i vitamina iz hrane.

Carbomed boji stolicu u crno što je medicinski beznačajno.

Prisutnost aktiviranog ugljena u probavnom sustavu može ometati eventualnu potrebu za hitnom pretragom probavnog sustava (endoskopijom) te otežati otkrivanje parazita u stolici pa u slučaju sumnje na parazitima uzrokovani proljev valja prije liječenja aktiviranim medicinskim ugljenom pregledati stolicu.

U slučaju akutne dizenterije s krvavom stolicom i povišenom temperaturom primjerenije je umjesto Carbomed granula primijeniti odgovarajući antibiotik.

U slučaju da uzeti otrov potiče mokrenje ili je uzet s alkoholom, nakon primjene Carbomed granula preporučuje se uzeti veću količinu tekućine (vode).

Djeca

Davanje ovog lijeka djeci mlađoj od 3 godine se ne preporučuje zbog toga što nije pouzdano siguran u primjeni.

Drugi lijekovi i Carbomed granule

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Aktivirani medicinski ugljen smanjuje učinak većine istodobno oralno primijenjenih lijekova. Uzrok je tomu njihovo vezanje na čestice ugljena. Zbog toga, pri istodobnoj primjeni, trebate paziti da razmak između njihova uzimanja bude najmanje dva sata.

Ženama koje primjenjuju oralne kontraceptive preporučuje se primjena drugih oblika kontracepcije za vrijeme uzimanja Carbomed granula.

Istodobna primjena sorbitola i aktiviranoga medicinskog ugljena može dovesti do dehidracije.

Carbomed granule s hranom i pićem

Mlijeko, sladoled i slični proizvodi smanjuju djelovanje aktiviranoga medicinskog ugljena.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek

U trudnica i dojilja nisu zabilježeni problemi vezani uz primjenu aktiviranoga medicinskog ugljena. Medicinski ugljen se ne resorbira iz probavnog trakta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Carbomed granule sadrže saharozu i lakoza hidrat

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Carbomed granule?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Lijek se primjenjuje uz nadzor liječnika/zdravstvenog djelatnika.

Granule je potrebno razmutiti u čaši (200 ml) vode ili čaja i dobivenu suspenziju popiti. Lijek se ne smije koristiti s mlijekom.

Ako lijek primjenjuje zdravstveni radnik može Vam suspenziju dati i putem želučane sonde.

Ukoliko je moguće, Carbomed granule treba uzeti u roku 30 minuta od unošenja otrova u organizam radi učinkovitijeg sprečavanja apsorpcije otrova. Međutim, čak i odgođena primjena može biti korisna.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza je 50 g granula (1 bočica Carbomed granula) razmućena u čaši vode ili čaja, na početku liječenja. Ako je potrebno, ponoviti primjenu svaka 4 sata ili češće.

Djeca mlađa od 12 godina

Preporučena doza je 25 g granula (1/2 boćice Carbomed granula), razmućena u čaši vode ili čaja, na početku liječenja. Ako je potrebno, ponoviti primjenu svaka 4 sata ili češće.

Ako je veća količina otrova progutana, i postoji rizik po život, preporučuje se doza od 50 g granula (1 boćica Carbomed granula).

Ne preporučuje se davanje aktiviranoga medicinskog ugljena djeci mlađoj od 3 godine.

Ako uzmete više Carbomed granula nego što ste trebali

S obzirom na način djelovanja aktiviranoga medicinskog ugljena, nema opasnosti od predoziranja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Aktivirani medicinski ugljen boji stolicu u crno.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- zatvor.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- povraćanje, bol u trbuhi;
- smanjena razina kalija u krvi (hipokalemija), povećana kiselost krvi (acidoza);
- udisanje čestica ugljena (aspiracija), otežano disanje, poremećaj disanja sa zatajenjem;
- blagi nadražaj kože i/ili sluznice, alergijska reakcija.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- stvaranje bezoara (nakupina neprobavljenih tvari u probavnom sustavu), začepljenje crijeva (zastoj prolaska crijevnog sadržaja), puknuće crijeva.

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Carbomed granule?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Carbomed granule sadrže?

Djelatna tvar je aktivirani ugljen. 1 g granula sadrži 385 mg aktiviranog ugljena.
Pomoćne tvari su: karmelozanatrij; magnezijev stearat; laktosa hidrat; saharoza.

Kako Carbomed granule izgledaju i sadržaj pakiranja?

Granule za oralnu suspenziju.

Carbomed 385 mg/g granule za oralnu suspenziju su granule crne boje.
50 g granula u smedoj staklenoj bočici s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.