

REFLUSTAT

Antirefluksna oralna suspenzija

1. SASTAV

Pročišćena voda, natrijev alginat, natrijev bikarbonat, natrijev karbonat, kalcijev karbonat, aroma, poliakrilna kiselina, natrijev propilparahidroksibenzoat, natrijev metilparahidroksibenzoat, saharinnatrij.

Bez glutena.

Bez lakoze.

2. PAKIRANJE

20 jednokratnih vrećica po 10 ml, u kutiji.

3. NAMJENA

Smanjenje simptoma gastroezofagealnog refluksa poput žgaravice, žgaravice tijekom trudnoće, povrata kiseline, refluksnog ezofagitisa, probavnih smetnji, kašla te nadražaja grla i ždrijela.

4. MEHANIZAM DJELOVANJA

Proizvod sadrži natrijev alginat i karbonate. Svoj učinak postiže zahvaljujući fizičkom mehanizmu djelovanja. Jednom kada proizvod dođe u kontakt s kiselim pH želuca, natrijev alginat (prirodni polimer ekstrahiran iz smeđih algi) taloži se formirajući gel. U međuvremenu, karbonati oslobađaju ugljični dioksid koji omogućava gelu da se izdigne i formira čep koji predstavlja fizičku barijeru koja sprječava refluks (povratak) želučanog soka u jednjak.

Osim toga, natrijev bikarbonat pomaže u smanjenju želučane kiselosti.

5. KADA I KAKO KORISTITI REFLUSTAT?

Odrasli i djeca starija od 12 godina

1 do 2 vrećice nakon glavnih obroka i prije spavanja.

Dobro protresti prije upotrebe.

Djeca do 12 godina

Koristiti samo prema preporuci liječnika.

Pažljivo slijedite upute svog liječnika o načinu primjene.

Upozorenja

- Nemojte koristiti RefluSTAT u slučaju teškog oštećenja bubrega.
- U slučaju alergije na bilo koji sastojak proizvoda, ne koristite ovaj proizvod.
- Ako prilikom primjene proizvoda primijetite bilo koju nuspojavu, prekinite s korištenjem proizvoda i obratite se svom liječniku.
- Proizvod može ometati apsorpciju lijekova uzetih na usta. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ukoliko uzimate oralno neke druge lijekove ili proizvode. U svakom slučaju, vremenski razmak od dva sata treba razmotriti između uzimanja RefluSTAT-a i ostalih proizvoda.
- Ako se simptomi ne poboljšaju nakon 7 dana primjene, obratite se liječniku.
- Proizvod može izazvati simptome nadutosti. Uporaba proizvoda u skladu s uputama smanjuje vjerojatnost pojave nadutosti.
- RefluSTAT sadrži male količine natrija 98,23 mg (4,27 mmol) i kalcija 32 mg (0,8 mmol) u svakoj vrećici (10 ml). Molimo obratite se liječniku ako ste na prehrani s ograničenim unosom soli, npr. u nekim slučajevima povišenog krvnog tlaka, srčane bolesti, oštećenja funkcije bubrega ili jetre i u slučaju hiperkalcemije, bubrežne kalcinoze i ako imate bubrežne kamence koji sadrže kalcij.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja proizvoda tijekom trudnoće ili dojenja.
- Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvanje

Nemojte koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i na vrećicama.

Proizvod čuvati na temperaturi 8-25° C, zaštićeno od svijetlosti i izvora topline. Proizvod se ne smije čuvati u hladnjaku.



6. DISTRIBUTER

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

7. DATUM ZADNJE REVIZIJE

Ožujak, 2016.

Medicinski proizvod



8. OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Pogledati upute za uporabu



Proizvođač



Rok valjanosti



Čuvati na temperaturi 8-25°C



Broj serije



CE oznaka s identifikacijskim brojem tijela