

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### **Pantexol 50 mg/g mast** dekspantenol

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Pantexol mast i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Pantexol mast?
3. Kako primjenjivati Pantexol mast?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Pantexol mast?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je Pantexol mast i za što se koristi?**

Pantexol mast sadrži djelatnu tvar dekspantenol. Dekspantenol pripada u skupinu cikatrizanata, za lokalnu primjenu.

Lokalno primijenjen dekspantenol koristi se:

- kao potporno liječenje u svrhu poticanja zacjeljivanja kože kod manjih površinskih oštećenja kože različitog uzroka (poput ogrebotina i opekлина) i blažih kožnih nadražaja (uzrokovanih suncem, ultraljubičastim ili rendgenskim zračenjem).
- kao neutralni izvor masnoće za njegu izrazito suhe kože.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Pantexol mast?**

##### **Nemojte primjenjivati Pantexol mast**

- ako ste alergični na dekspantenol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

##### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Pantexol mast.

Posavjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste alergični ili uzimate još neke lijekove.

Mast je namijenjena isključivo za vanjsku uporabu, a budući da uzrokuje nadražaj oka treba izbjegavati kontakt s očima.

Izbjegavati kontakt s ušima i sluznicama.

Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati.  
Ako dođe do pojave lokalnog kožnog nadražaja, trebate privremeno prekinuti primjenu masti.

### **Drugi lijekovi i Pantexol mast**

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Interakcije se ne opisuju, budući da se istodobno ne primjenjuju drugi lijekovi na oboljelo mjesto.

### **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoje podaci o štetnim učincima lokalne primjene dekspantenola tijekom trudnoće i dojenja.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Pantexol mast ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

### **Pantexol mast sadrži lanolin, cetilni i stearyl alkohol, propilenglikol, butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen, metilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoat.**

Lanolin i cetilni i stearyl alkohol mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Propilenglikol može nadražiti kožu.

Butilhidroksianizol i butilhidroksitoluen mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili nadražiti oči i sluznice.

Metilparahidroksibenzoat i etilparahidroksibenzoat mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene).

## **3. Kako primjenjivati Pantexol mast?**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Pantexol mast primijenite lokalno na oboljelo područje kože, 1-2 puta na dan, a po potrebi i češće. Nanesite mast u tankom sloju koji se lagano utrlja u zahvaćeno kožno područje.

Ako imate osjećaj da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

### **Ako primijenite više Pantexol masti nego što ste trebali**

Nisu zabilježene tegobe kod prekomjernog korištenja masti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Moguće su lakše alergijske reakcije.

U slučaju pojave alergijske reakcije potrebno je prekinuti korištenje masti.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti zdravstvenog djelatnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V.**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

### **5. Kako čuvati Pantexol mast**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, tubu čuvati čvrsto zatvorenu.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 12 mjeseci.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakiranju iza kratice EXP.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

### **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

#### **Što Pantexol mast sadrži?**

Djelatna tvar je dekspantenol. 1 g masti sadrži 50 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari su: Phenonip ME (fenoksietanol, metilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoat), lanolin, bijeli vosak, bijeli vazelin, dimetikon, Lanette SX (cetilni i steartilni alkohol, natrijev laurilsulfat, natrijev cetostearilsulfat), Protegin W (bijeli vazelin, ozokerite vosak, hidrogenirano ricinusovo ulje, glicerol monoizostearat, oleatna kiselina), propilenglikol, butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen, dekametilklopentasiloksan, magnezijev sulfat heptahidrat, pročišćena voda.

#### **Kako Pantexol mast izgleda i sadržaj pakiranja?**

Homogena mast, svijetložute boje, svojstvena mirisa.

25 g masti u Al tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

#### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka,

#### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2018.**