

Namjena

Normia STOP je medicinski proizvod koji se koristi za obnovu fiziološke funkcije stijenke crijeva. Formuliran je specifično za kontrolu i smanjenje simptoma povezanih s proljevom koji nastaje zbog različitih uzroka, poput napetosti u trbuhu i učestalih stolica. Učinkovit je unutar 12 sati.

Želatinski tanat ne mijenja se u želucu i djeluje tako da formira sloj koji štiti sluznicu crijeva smanjujući učestalost i trajanje epizoda proljeva.

Pakiranja

20 vrećica koje sadrže prašak za primjenu u djece.

Blister pakiranje koje sadrži 15 kapsula za primjenu u odraslih.

Sastav

Prašak: 250 mg želatinskog tanata (svinjskog podrijetla).

Kapsule: 500 mg želatinskog tanata (svinjskog podrijetla), kukuruzni škrob i magnezijev stearat (biljnog podrijetla).

Upute za uporabu

Prašak: sadržaj jedne vrećice potrebno je promiješati s malom količinom pića koje nije toplo, kao što je mlijeko, voćni sok ili voda te odmah primijeniti. Može se također dodati u jogurt ili neku drugu hranu. Nemojte primjenjivati proizvod izravno bez miješanja.

Kapsule: progutajte kapsule s tekućinom.

Doziranje

Djeca mlađa od 3 godine: 1 vrećica svakih 6 sati do nestanka simptoma

Djeca u dobi od 3 do 14 godina: 1 ili 2 vrećice svakih 6 sati do nestanka simptoma

Odrasli i djeca starija od 14 godina: 1 do 2 kapsule svakih 4 do 6 sati do nestanka simptoma

Upozorenja

- Savjetovanje s liječnikom prije primjene proizvoda nije potrebno. Međutim, preporučuje se u slučaju teških ili ustrajnih simptoma ili kada postoje dvojbe oko dijagnoze.
- U slučaju proljeva u djece mlađe od 3 godine te u starijih osoba preporučuje se savjetovanje s liječnikom, posebice kada su prisutni drugi simptomi.
- Ovaj medicinski proizvod nije farmakološko liječenje. Ako liječnik preporučuje takvo liječenje, proizvod se može primjenjivati istodobno.
- Preporučuje se obilat unos tekućine te mjere prehrane inače prihvaćene u liječenju proljeva.
- Bez obzira na to što nema poznatih nuspojava, preporučuje se proizvod ne koristiti tijekom trudnoće ili dojenja, osim ako liječnik ne odluči drugačije.
- Ne koristite proizvod nakon isteka roka valjanosti otisnutog na proizvodu.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako su blisteri ili vrećice otvoreni ili oštećeni.
- Ovaj medicinski proizvod ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Ne zamrzavati.
- Čuvati izvan dohvata djece.

Kontraindikacije

Normiju STOP ne smiju uzimati bolesnici s poznatom preosjetljivošću na želatinski tanat ili na bilo koji drugi sastojak proizvoda.

Distributer

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

 NOVENTURE, S.L
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona
Španjolska