

UPUTE ZA UPORABU

LACTOGYN VAGITORIJI

UPUTE ZA UPORABU - pažljivo pročitajte

LACTOGYN vagitoriji. Medicinski proizvod koji sadrži natrijevu sol hijaluronske kiseline, polikarbofil, mliječnu kiselinu, vitamin E, vitamin A, 18-beta-gliciretinsku kiselinu, ulje čajevca, fosfatidilkolin, polusintetske triglyceride.

Opis:

LACTOGYN vagitoriji su medicinski proizvod koji pomaže u očuvanju prirodnog obrambenog mehanizma rodnice i spriješuje obnovu vaginalne flore. Sadrže natrijevu sol hijaluronske kiseline i mliječnu kiselinu koje pomažu u otklanjanju simptoma zbog neravnoteže vlažnosti i/ili pH rodnice.

Hijaluronska kiselina u obliku natrijeve soli u dozi od 10 mg/vagitorij ima učinak vlaženja i podmazivanja suhe rodnice, što doprinosi obnovi prirodnog i ugodnog vaginalnog okruženja.

Mliječna kiselina, koja je i inače prisutna u rodnici, potiče trenutnu korekciju pH vrijednosti i potpomaže prirodnu obnovu osjetljivog vulvovaginalnog ekosustava.

Polikarbofil u dodiru sa sluznicom rodnice neprestano oslobađa H⁺ ione koji doprinose snižavanju pH vaginalnog okruženja.

Namjena:

LACTOGYN vagitoriji korisni su u sprječavanju i liječenju nespecifične suhoće rodnice i suhoće povezane s atrofičnim vaginitisom. Pomoćno su sredstvo u slučaju nadraženosti, osjećaja peckanja i svrbeža rodnice te infektivnih i upalnih stanja rodnice. Indicirani su za žene reproduktivne dobi, žene u menopauzi i perimenopauzi. Proizvod se može upotrebljavati s prezervativima.

Doziranje:

Umetnuti jedan vagitorij dnevno u rodnici, po mogućnosti uvečer prije odlaska na spavanje, tijekom 5 – 7 dana nakon završetka menstruacije ili prema uputi liječnika.

Upute za uporabu:

- 1) Dobro operite područje rodnice prije primjene (po mogućnosti vanjsko i unutarnje ispiranje rodnice).
- 2) Temeljito operite ruke prije otvaranja blistera i izvadite jedan vagitorij.
- 3) Nježno umetnite vagitorij duboko u rodnici, po mogućnosti ležeći na leđima, kako biste spriječili slučajno ispadanje vagitorija iz rodnice.

Uvjeti Čuvanja:

Pakiranje čuvati pravilno zatvoreno, na suhom mjestu, na temperaturi od 5 °C do 25 °C, podalje od izvora svjetlosti i topline.

Kontraindikacije:

Poznata preosjetljivost na bilo koji od sastojaka proizvoda.

Upozorenja:

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Nemojte progutati. Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje prethodno otvoreno ili oštećeno. Nemojte upotrebljavati proizvod nakon isteka roka valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na neotvoreni proizvod koji se pravilno čuva. Nemojte upotrebljavati proizvod u slučaju oštećenja (lezija) i rana u rodnici. U slučaju istodobne primjene s drugim terapijama, bilo lijekovima ili medicinskim proizvodima, morate se savjetovati sa svojim liječnikom. Nemojte upotrebljavati proizvod tijekom menstruacije. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu bez savjetovanja s liječnikom. Uporaba proizvoda, posebno dugotrajna, može uzrokovati pojavu osjetljivosti. U tom slučaju prekinite liječenje i savjetujte se s liječnikom kako biste započeli s odgovarajućom terapijom. Obavezno obavijestite liječnika ili ljekarnika o svim neželjenim učincima koji nisu navedeni u uputi za uporabu. Nemojte upotrebljavati proizvod više od 30 uzastopnih dana.

Mjere opreza:

U trudnica, žena koje doje i djece vagitoriji se smiju upotrebljavati samo ako je to nužno i pod nadzorom liječnika. U slučaju netaknutog himena, prije primjene savjetujte se sa svojim ginekologom u vezi s posebnim uvjetima uporabe. Proizvod za jednokratnu primjenu. Ako vagitorij slučajno ispadne iz rodnice, nemojte ga ponovno upotrijebiti.

Pakiranje:

Složiva kutija, s dva blistera s po 5 vagitorija (10 vagitorija / pakiranje), 2 g / vagitorij.



Gruppo Farmaimpresa srl – via Cipro, 1 – 25124 Brescia – Italija

Distributer:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJI d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Rev.03: 26.11.2016.

Objašnjenje simbola na proizvodu:

Proizvođač



Rok valjanosti



Broj serije




Pročitajte upute za
uporabu



Upozorenje, pogledajte
upute za uporabu (za
važna upozorenja/mjere
opreza)



Jednokratna primjena/Nije
namijenjeno ponovnom
korištenju



Čuvati na temperaturi od
5°C do 25°C



CE oznaka s
identifikacijskim brojem
tijela

