

RefluSTAT

antirefluksna oralna suspenzija

Sastav

Pročišćena voda, natrijev alginat, natrijev bikarbonat, natrijev karbonat, kalcijev karbonat, aroma, poliakrilna kiselina, natrijev propilparahidroksibenzoat, natrijev metilparahidroksibenzoat, saharinnatrij.

Bez glutena.

Bez laktoze.

Pakiranje

20 jednokratnih vrećica po 10 ml, u kutiji.

Namjena

Smanjenje simptoma gastroezofagealnog refluksa poput žgaravice, žgaravice tijekom trudnoće, povrata kiseline, refluksnog ezofagitisa, probavnih smetnji, kašlja te upale grkljana i ždrijela.

Mehanizam djelovanja

Proizvod sadrži natrijev alginat i karbonate. Svoj učinak postiže zahvaljujući fizičkom mehanizmu djelovanja. Jednom kada proizvod dođe u kontakt s kiselim pH želuca, natrijev alginat (prirodni polimer ekstrahiran iz smeđih algi) taloži se formirajući gel. U međuvremenu, karbonati oslobađaju ugljični dioksid koji omogućava gelu da se izdigne i formira čep koji predstavlja fizičku barijeru koja sprječava refluks (povratak) želučanog soka u jednjak.

Osim toga, natrijev bikarbonat pomaže u smanjenju želučane kiselosti.

Kada i kako koristiti RefluSTAT?

Odrasli i djeca starija od 12 godina

1 do 2 vrećice nakon glavnih obroka i prije spavanja. Uzima se izravno iz vrećice u usta.

Dobro protresti prije upotrebe.

Djeca do 12 godina

Koristiti samo prema preporuci liječnika.

Pažljivo slijedite upute svog liječnika o načinu primjene.

Upozorenja

- Nemojte koristiti RefluSTAT u slučaju teškog zatajenja bubrega.
- Nemojte koristiti u slučaju preosjetljivosti (alergije) na bilo koji sastojak proizvoda.
- Ako prilikom primjene proizvoda primijetite bilo koju nuspojavu, prekinite s korištenjem proizvoda i obratite se svom liječniku.
- Proizvod može ometati apsorpciju lijekova uzetih na usta. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ukoliko uzimate oralno neke druge lijekove ili proizvode. U svakom slučaju, morate poštovati vremenski razmak od 2 sata između uzimanja RefluSTAT-a i ostalih proizvoda.
- Ako se simptomi ne poboljšaju nakon 7 dana primjene, obratite se liječniku.
- Proizvod može izazvati simptome nadutosti. Uporaba proizvoda u skladu s uputama smanjuje vjerojatnost pojave nadutosti.
- Ovaj proizvod sadrži približno 100 mg (4,4 mmol) natrija i približno 36 mg (0,9 mmol) kalcija u svakoj vrećici (10 ml). Molimo obratite se liječniku ako ste na prehrani s ograničenim unosom soli, npr. u nekim slučajevima povišenog krvnog tlaka, problema sa srcem, jetrom ili bubrežima i u slučaju hiperkalcemije, nefrokalcinoze i ako imate bubrežne kamence koji sadrže kalcij.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i na vrećicama.

Čuvanje

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Proizvod čuvati na temperaturi od 8°C do 25°C, zaštićen od svjetlosti i izvora topline. Proizvod se ne smije čuvati u hladnjaku.



Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD), Italija

Distributer

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Datum posljednje revizije

10. ožujka 2020.

(IFU2_03/20r0_04/20)

medicinski proizvod **CE**₀₃₇₃

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pogledati upute za uporabu



Čuvati na temperaturi od 8°C do 25°C



Proizvođač



Broj serije



Rok valjanosti



CE oznaka s identifikacijskim brojem tijela