

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

RU

АЛТЕЙ СИРОП

Регистрационный номер

П N014964/01

Торговое наименование

АЛТЕЙ СИРОП

Международное непатентованное или группировочное наименование

Аллея лекарственного корней экстракт

Лекарственная форма

Сироп

Состав на 100 г

Действующее вещество: экстракт корня аллея лекарственного 35,9 г; *Вспомогательные вещества:* сахароза, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат.

Описание

Вязкая жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом. При хранении возможно появление легкой опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Препарат оказывает отхаркивающее, местное противовоспалительное действие, способствует снижению вязкости бронхиального секрета.

Показания к применению

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете пониженным содержанием углеводов. Перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Нет данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Детям до 12 лет - по 1 чайной ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/4 стакана теплой воды, 3-4 раза в день после еды.

Детям старше 12 лет и взрослым – по 1 столовой ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/2 стакана теплой воды, 4-5 раз в день после еды.

Длительность лечения составляет 10-15 дней.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом лечащему врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: отмена препарата, промывание желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа содержится около 4,2 г сахарозы (0,35 XE), в 1 столовой ложке – около 16,8 г сахарозы (1,4 XE).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Сироп. По 150 мл препарата во флакон из пластика коричневого цвета, снабженный крышкой из сополимера полипропилена с прокладкой из нейтрального полиэтилена. Каждый флакон с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

Производитель (все стадии, включая выпускающий контроль качества)

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

Организация, принимающая претензии потребителей

Представительство ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о. в России
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. 30.
тел./факс: (495) 970-18-82

ASUT111/V7

