

RefluSTAT

ANTIREFLUKSNA
PERORALNA SUSPENZIJA

Sestava

Prečiščena voda, natrijev alginat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev karbonat, kalcijev karbonat, aroma, poliakrilna kislina, natrijev propilparahidroksibenzoat, natrijev metilparahidroksibenzoat, natrijev saharin.

brez glutena
brez laktoze

Pakiranje

20 enoodmernih vrečic po 10 ml, v škatli.

Namen

Lajša simptome gastroezofagealnega refluksa kot so zgaga, zgaga med nosečnostjo, dviganje kisline, refluksnega ezofagitisa, prebavnih motenj, kašlja ter razdraženega grla in žrela.

Delovanje

Izdelek vsebuje natrijev alginat in karbonate. Učinek doseže na fizikalni način. Ko izdelek pride v stik s kislim pH v želodcu, natrijev alginat (naravni polimer, pridobljen iz rjavih alg) tvori gel. Medtem karbonati sprostijo ogljikov dioksid, ki omogoči gelu, da se dvigne in tvori čep, ki predstavlja fizično pregrado, le-ta pa prepreči refluks (dviganje) želodčnega soka v požiralnik. Poleg tega natrijev hidrogenkarbonat pomaga zniževati kislost v želodcu.

Kdaj in kako uporabljati RefluSTAT?

Odrasli in otroci, starejši od 12 let

1 do 2 vrečici po glavnem obroku in pred spanjem. Jemljite naravnost iz vrečice v usta. Pred uporabo dobro pretresite.

Otroci do 12 let

Uporabljajte le po posvetu z zdravnikom. Glede uporabe upoštevajte navodila zdravnika.

Opozorila

- Ne uporabljajte izdelka RefluSTAT v primeru hude okvare ledvic.
- Ne uporabljajte izdelka v primeru alergije na katero koli sestavino izdelku.
- Če med uporabo izdelka opazite neželeni učinek, prekinite z uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Izdelek lahko moti absorpcijo zdravil, kijih jemljete skozi usta. Posvetujte se s svojim zdravnikom, v kolikor jemljete druga zdravila ali druge izdelke za peroralno uporabo. V vsakem primeru je treba med jemanjem izdelka RefluSTAT in ostalih proizvodov upoštevati dve urni časovni razmak.
- Če se simptomi ne izboljšajo po 7 dneh

uporabe, se posvetujte z zdravnikom.

- Izdelek lahko izzove napenjanje. Uporaba izdelka skladno z navodili zmanjšuje verjetnost pojava napenjanja.
- Vsaka vrečica izdelka RefluSTAT (10 ml) vsebuje majhne količine natrija 98,23 mg (4,27 mmol) in kalcija 32 mg (0,8 mmol). Prosimo, da se posvetujete z zdravnikom o jemanju izdelka, če imate dieto z omejenim vnosom soli, npr. pri nekaterih primerih povišanega krvnega pritiska, bolezni srca, okvarjene funkcije ledvic ali jeter, v primeru hiperkalcemije, ledvične kalcinoze in če imate ledvične kamne, ki vsebujejo kalcij.
- V primeru nosečnosti in dojenja se pred jemanjem posvetujte s svojim zdravnikom.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjevanje

Ne uporabljajte izdelka po poteku roka uporabnosti, navedenega na ovojnini in na vrečicah.

Izdelek shranjujte pri temperaturi od 8 do 25°C, zaščitite ga pred svetlobo in viri toplote. Izdelka ne smete hraniti v hladilniku.



Biofarma Spa - Via Castelliere 2 - Mereto di Tomba (UD), Italija

Distributer

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.o.o.
Ljubljana, Litostrojska cesta 46A,
1000 Ljubljana, Slovenija.

Datum zadnje revizije

maj, 2018

Medicinski pripomoček



Pojasnilo oznak na izdelku



Preberite navodila za uporabo



Shranjujte pri temperaturi 8-25°C



Proizvajalec



Serija



Rok uporabnosti



CE oznaka z identifikacijskim

številom

930000400/02
(IFU1r1_03/19)



jgl