

RefluSTAT

ANTIREFLUKSNA
ORALNA SUSPENZIJA

RS

Sastav

Prečišćena voda; natrijum alginat; natrijum bikarbonat; natrijum karbonat; kalcijum karbonat; aroma; poliakrilna kiselina; natrijum propil-p-hidroksi-benzoat, natrijum metil-p-hidroksibenzoat, natrijum saharinat.

**Bez glutena.
Bez laktoze.**

Dostupna pakovanja:

20 kesica za jednokratnu upotrebu od 10 ml, u kutiji.

Namena

Smanjenje simptoma gastroezofagealnog refluksa kao što su gorušica, gorušica tokom trudnoće, vraćanje kiseline, refluksni ezofagitis, loše varenje, kašalj i upala grla i ždrela.

Mehanizam delovanja

Proizvod sadrži natrijum alginat i karbonate. Svoj efekat postiže zahvaljujući fizičkom mehanizmu delovanja. Jednom kada proizvod dođe u kontakt s kiselim pH želuca, natrijum alginat (prirodni polimer ekstrahovan iz smeđih algi) taloži se formirajući gel. U međuvremenu, karbonati oslobađaju ugljendioksid koji omogućava gelu da se izdigne i formira čep koji predstavlja fizičku barijeru koja sprečava refluks (povratak) želučanog soka u jednjak.

Kada i kako koristiti RefluSTAT?

Odrasli i deca starija od 12 godina

1 do 2 kesice nakon glavnih obroka i pre spavanja. Sadržaj kesice sipati direktno u usta. Dobro promućkati pre upotrebe.

Deca do 12 godina

Davati samo nakon savetovanja sa lekarom. Pažljivo sledite uputstva svog lekara o načinu primene.

Upozorenja

- Nemojte koristiti RefluSTAT u slučaju akutne bubrežne insuficijencije.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju preosetljivosti na sastojke.
- Ako se pojave neželjeni efekti, prekinite korišćenje i obratite se svom lekaru.
- Proizvod može ometati apsorpciju oralno uzetih lekova. Posavetujte se sa svojim lekarom ukoliko uzimate oralno neke druge lekove. U svakom slučaju, treba uzeti u obzir vremenski interval od 2 sata između uzimanja REFLUSTATA i primene drugog leka.

- Ako se simptomi ne poboljšaju nakon 7 dana primene, obratite se lekaru.
- Proizvod može izazvati simptome nadimanja. Upotreba proizvoda u skladu s uputstvom smanjuje verovatnoću pojave nadimanja.
- Proizvod sadrži približno 100 mg (4,4 mmol) natrijuma i približno 36 mg (0,9 mmol) kalcijuma u svakoj kesici (10 ml). Molimo obratite se lekaru ako ste na režimu ishrane sa ograničenim unosom soli, npr. u nekim slučajevima povišenog krvnog pritiska, srčane, bubrežne ili jetrene insuficijencije i u slučaju hiperkalcijemije, bubrežne kalkuloze i ako imate ponovljeni nastanak bubrežnih kamenaca koji sadrže kalcijum.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju i na kesicama.

Čuvanje

Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Proizvod čuvati na temperaturi od 8 °C do 25 °C, zaštićen od svetlosti i izvora toplote. Ne čuvati u frižideru.



Biofarma -Via Castelliere 2- Mereto di Tomba (UD), Italija

Ovlašćeni predstavnik proizvođača:

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT,
Milosava Vlajića 110A, Sopot

Datum poslednje revizije

Mart, 2020.

(IFU2_03/20r1_10/24)

Medicinsko sredstvo



0373

Objašnjenje korišćenih simbola



Pogledajte uputstva za upotrebu



Čuvati na temperaturi 8 °C - 25 °C



Proizvođač



Broj serije



Rok upotrebe



CE oznaka s identifikacionim brojem notifikovanog tela

