

REFLUSTAT

žvečljive tablete

Brez glutena.

Brez laktoze.

Namen uporabe

REFLUSTAT je izdelek katerega delovanje temelji na natrijevem alginatu, natrijevem hidrogenkarbonatu, natrijevem karbonatu in kalcijevem karbonatu ter 3 sinergijskih učinkih: blokira vračanje kisline, zmanjšuje pekoč občutek in ščiti sluznico požiralnika.

REFLUSTAT je namenjen lažšanju simptomov gastroezofagealnega refluksa kot so zgaga, zgaga med nosečnostjo, refluksni ezofagitis, vračanje želodčne kisline, prebavne motnje, nočni simptomi refluksa, kašelj ter vnetje grla in žrela zaradi refluksa.

Sestava

Natrijev alginat, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev karbonat, kalcijev karbonat, sorbitol, magnezijev stearat (rastlinski), hidroksipropilceluloza, aroma, silicijev dioksid, sukraloza, steviol glikozidi.

Mehanizem delovanja

REFLUSTAT vsebuje natrijev alginat in karbonate, učinek pa doseže z mehanskim načinom delovanja. Ko izdelek pride v stik s kislim pH želodca, se natrijev alginat (naravni polimer ekstrahiran iz rjavih alg) nalaga in tvori gel. Obenem karbonati

sproščajo ogljikov dioksid, ki omogoči, da gel oblikuje čep, ki predstavlja fizično pregrado za preprečevanje refluksa (vračanje) želodčne kisline v požiralnik. Poleg tega natrijev hidrogenkarbonat pomaga pri zmanjševanju želodčne kislosti. Zaradi svojih posebnih lastnosti, izdelek ščiti sluznico požiralnika pred učinkom kisline, saj deluje kot pregrada. Tako spodbuja regeneracijo in pomaga pri preprečevanju tveganja za ponovni pojav refluksnega ezofagitisa. Formulacija, ki jo zaznamuje specifično ravnotežje med natrijevim alginatom in karbonati, omogoča hitro delovanje.

Način uporabe in odmerjanje

Odrasli in otroci, starejši od 12 let: 2 ali 4 tablete po glavnih obrokih in pred spanjem. Tablete je treba dobro prežvečiti. Prav tako lahko po jemanju tablet pijete vodo.

Opozorila

Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojniku. Ne uporabljajte v primeru hudih motenj v delovanju ledvic.

Izdelka ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katero koli sestavino izdelka.

Če med uporabo izdelka opazite kakršne koli neželene učinke, prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte s svojim zdravnikom. Izdelek lahko ovira absorpcijo zdravil, ki se jemljejo peroralno. Zato je priporočljivo, da se posvetujete z

RefluSTAT

ŽVEČLJIVE
TABLETE

zdravnikom, če jemljete peroralna zdravila, ki jih je v vsakem primeru treba jemati z najmanj dvournim časovnim zamikom.

Če se simptomi ne izboljšajo po 7 dneh uporabe, se posvetujte z zdravnikom. Izdelek lahko povzroči simptome napihnjenosti. Uporaba izdelka v skladu z navodili zmanjšuje verjetnost pojava napihnjenosti.

Izdelek vsebuje približno 100 mg (4,4 mmol) natrija in približno 36 mg (0,9 mmol) kalcija na odmerek (2 tableti po 1 g). Prosimo, posvetujte se z zdravnikom, če ste na dieti z omejenim vnosom soli, npr. v primerih povišanega krvnega tlaka, težav s srcem, jetri ali ledvicami, ter pri hiperkalcemiji, nefrokalcinozi ali če imate ledvične kamne, ki vsebujejo kalcij.

Shranjevanje

Shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi od 8 °C do 25 °C, zaščiten pred svetlobo in viri toplote.

Pakiranje

20 žvečljivih tablet po 1 g



Biofarma – Via Castelliere 2 –
Mereto di Tomba (UD), Italija

Distributer za Slovenijo

JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.o.o. Ljubljana,
Litostrojska cesta 46 A,
1000 Ljubljana, Slovenija

Datum zadnje revizije:

Maj 2024.

medicinski pripomoček



Pojasnilo simbolov na izdelku



Glejte navodila za uporabo



Proizvajalec



Številka serije



Rok uporabnosti



Izdelek shranjujte pri temperaturi
od 8 °C do 25 °C.



oznaka CE₀₃₇₃ z identifikacijsko
številko priglašene organa

