

carbomed plus

HR

Carbomed Plus **Dvoslojne tablete**

Ublažava simptome nadutosti i vjetrova.
Pomaže eliminaciji probavnih plinova.

1. Sastav i namjena proizvoda

Carbomed Plus je medicinski proizvod koji pomaže kod ublažavanja simptoma povezanih s nadutosti i vjetrovima u crijevima uzrokovanih nakupljanjem plinova.

Carbomed Plus djeluje protiv grčeva i povezanih bolova te sprječava vjetrove i nadutost.

1.1. Mehanizam djelovanja

Učinkovitost proizvoda se temelji na simetikonu koji smanjuje površinsku napetost mjehurića pjene u crijevima i uzrokuje njihovo raspadanje čime se oslobađaju plinovi i zrak (učinak protiv pjenjenja), u kombinaciji s djelovanjem ugljena na apsorpcije crijevnih plinova: djelovanje proizvoda stoga se temelji isključivo na fenomenima mehaničke prirode. Dvoslojna tableta omogućuje oslobađanje otprilike 50% sastojaka u želucu unutar 15 minuta nakon primjene, dok se potpuno raspadanje tablete događa u crijevima unutar 1 sata. Sastojci se ne apsorbiraju u probavnom traktu i ne ometaju apsorpciju hranjivih tvari.

1.2. Sastav

Svaka tableta sadrži:

- 50 mg simetikona
- 300 mg ugljena

Pomoćne tvari: maltodekstrin, saharoza, mikrokristalična celuloza, hidroksipropilmetilceluloza, polivinilpirolidon, koloidni silicij, umrežena karmelozanatrij, polivinilpolipirrolidon, glicerol behenat, silicijev dioksid, magnezijev stearat.

2. Pakiranje

Svaka kutija sadrži 20 dvoslojnih tableta za jednokratnu primjenu.

3. Doziranje i način primjene

Odrasli: Preporučeno je uzimanje 1-2 tablete nakon dva glavna obroka, do najviše 4 tablete dnevno.

Adolescenti starosti od 14 do 18 godina: 1 tableta nakon dva glavna obroka, do najviše 2 tablete dnevno.

Izvadite tabletu iz blistera i popijte ju uz čašu vode.

4. Nuspojave

U preporučenim dozama može se uočiti smeđa boja stolice zbog prisutnosti ugljena. To je fiziološka pojava i ne podrazumijeva nikakvo patološko značenje. Nisu poznate značajne nuspojave kod dulje primjene. Proizvod ne utječe negativno na razinu pažnje. Mogu se pojaviti i nuspojave koje se razlikuju od navedenih: obratite se liječniku u slučaju pojave neočekivanih simptoma.

5. Interakcije s dodacima prehrani i lijekovima

Apsorbirajuće djelovanje ugljena i simetikona može nepovoljno utjecati na učinkovitost drugih lijekova koji se uzimaju u isto vrijeme. U slučaju istodobne primjene drugih lijekova posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog proizvoda. Simetikon može ometati učinak nekih reagensa koji se koriste u dijagnostici, kao što je *guaiac* guma.

6. Čuvanje

Držite *Carbomed Plus* na suhom mjestu i dalje od izravnih izvora topline ili svjetlosti: blister otvarajte samo kada je u upotrebi. Proizvod nemojte koristiti u slučaju oštećenog pakiranja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Držite proizvod na temperaturi ispod 25°C.

carbomed plus

7. Upozorenja i mjere opreza

Proizvod nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 14 godina.

Čuvati izvan dohvata djece.

Nemojte upotrebljavati proizvod nakon isteka roka valjanosti otisnutog na kutiji.

Nemojte uzimati proizvod u ležećem položaju.

Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno.

Svaka tableta je za jednokratnu upotrebu i potrebno ju je izvaditi iz pakiranja neposredno prije uzimanja. Nemojte uzimati djelomično iskorištene tablete (zdrobljene ili slomljene) ili izvađene iz blistera u nepoznato vrijeme, jer takva pogrešna primjena može predstavljati rizik od kontaminacije proizvoda.

Ne koristiti u prisutnosti želučanih ili crijevnih lezija.

Ne koristiti u slučaju crijevne blokade.

U slučaju **trudnoće ili dojenja**, medicinski proizvod uzimati samo ako je potrebno i nakon savjetovanja s liječnikom.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu jer veće količine mogu uzrokovati pojavu nuspojava.

Nemojte koristiti proizvod dulje od 30 uzastopnih dana.

Ako simptomi potraju, obratite se svom liječniku.

Ne uzimati u slučaju intolerancije na proizvod.

Ne uzimati u slučaju poznate preosjetljivosti na sastojke.

8. Rok valjanosti

Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na kutiji.

Rok valjanosti odnosi se na proizvod u neoštećenoj ambalaži, pravilno skladišten.

9. Zbrinjavanje

Proizvod s isteklim rokom valjanosti ili neiskorišteni lijek potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Ni u kojem slučaju proizvod ili njegovu ambalažu nemojte bacati u okoliš.



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Italija

Distributer: JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20,
51000 Rijeka, Hrvatska

Datum posljednje revizije: lipanj 2025.

Simboli na proizvodu:

Simbol Objašnjenje



Pogledati upute za uporabu



Rok valjanosti



Broj serije



Proizvođač



Jedna doza za jednu primjenu



Proizvod čuvati na temperaturi do 25°C



CE₀₄₂₆ oznaka s identifikacijskim brojem tijela