vizol S INTENSIVE

HR

KAPI ZA OKO

UPUTE ZA UPORABU – PAŽLJIVO PROČITAJTE

Vizol S INTENSIVE kapi za oko namijenjene su vlaženju, umirivanju i zaštiti suhog i iritiranog oka.

SASTAV

Natrijev hijaluronat 0,15%, dekspantenol 2%, natrijev klorid, natrijev citrat dihidrat, monohidrat limunske kiseline, pročišćena voda.

BEZ KONZERVANSA.
BEZ FOSFATA.

NAMJENA

Vizol S INTENSIVE kapi za oko namijenjene su ublažavanju simptoma blagog do umjerenog suhog oka. Stabiliziraju suzni film, podmazuju i umiruju površinu oka.

Primjena kapi za oko pruža intenzivnu njegu i zaštitu kod:

- **suhoće i mehaničke iritacije uzrokovane vanjskim uvjetima:** vjetar, suhi zrak, klimatizacijski uređaji, zagađenje zraka, prašina, nošenje leća, dijagnostički i kirurški zahvati na očima.
- **naprezanja očiju i iritacije uzrokovane smanjenim treptanjem** tijekom dugotrajnog fokusiranog gledanja u digitalne ekrane, tijekom vožnje, preciznog rada.

Vizol S INTENSIVE ima dvostruki učinak: sadrži **natrijev hijaluronat** koji učinkovito vlaži oko i stabilizira suzni film te **dekspantenol (provitamin B5)** koji dodatno vezuje vodu, umiruje i štiti površinu oka.

Primjena kapi omogućuje brzo olakšavanje neugodnih simptoma na oku.
Simptomi suhog oka mogu se ublažiti i tako spriječiti komplikacije.

Čimbenici rizika za suho oko, tj. poremećaj suznog filma uzrokovan nedostatkom suza ili njihovim obilnim hlapljenjem:

- Starenje
- Spol (hormonske promjene u žena tijekom trudnoće, dojenja, menopauze)
- Moderan stil života (dugotrajan rad na računalu, boravak, rad i putovanje u klimatiziranim prostorima)
- Uvjeti okoline (vjetar, suhi zrak, prašina, dim, zagađenje zraka, klimatizacijski uređaji, neonska svjetla)
- Dijagnostički i kirurški zahvati na oku
- Prisutnost stranog tijela u oku
- Nošenje kontaktnih leća
- Korištenje dekongestivnih kapi za oko
- Lijekovi (za liječenje depresije, visokog krvnog tlaka, ili za sprječavanje trudnoće)
- Bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitnjače, glaukom)

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Nemojte koristiti Vizol S INTENSIVE kapi za oko:

- u slučaju preosjetljivosti (alergije) na natrijev hijaluronat, dekspantenol ili bilo koji drugi sastojak Vizol S INTENSIVE kapi za oko.

U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti korištenje proizvoda i javiti se liječniku.

Ostala upozorenja:

- Ako primijetite da su Vizol S INTENSIVE bočica ili aplikator oštećeni nemojte koristiti proizvod.
- Kako bi se osigurala sigurna primjena i higijena, svaku bočicu proizvoda trebala bi koristiti samo jedna osoba.
- Nisu poznate interakcije između Vizol S INTENSIVE i otopina za kontaktne leće te drugih kapi za oko ili masti za primjenu u oku. Ako koristite još neki proizvod za primjenu u oku, pričekajte barem 15 minuta između primjene.

Napomena:

Odmah nakon primjene kapi, proizvod može uzrokovati blago zamućenje vida tijekom vrlo kratkog vremenskog perioda. U tom slučaju, preporučuje se da izbjegavate vožnju automobila ili rukovanje strojevima dok Vam vid ponovno ne postane jasan.

SIGURNOST PROIZVODA

Vizol S INTENSIVE kapi za oko su **bez konzervansa** i **bez fosfata**, što smanjuje mogućnost iritacije i oštećenja površine oka.
Tehnologija aplikatora bočice sadržava filtar koji proizvod čini sigurnim za primjenu jer sprječava onečišćenje otopine **i čuva sterilnost sadržaja čak 6 mjeseci nakon otvaranja.**
Proizvod se općenito dobro podnosi. Međutim, ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

UPUTE ZA UPORABU

Uvijek koristite Vizol S INTENSIVE prema ovim uputama za uporabu.
Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uporabe ako niste sigurni.

Ako liječnik nije drugačije propisao, ukapajte 1-2 kapi u oči, više puta dnevno, prema potrebi.
Trepnite nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka.

Vizol S INTENSIVE kapi za oko su pogodne za dugotrajnu primjenu.

Izbjegavajte kontakt vrha kapaljke s površinom oka ili bilo kojom drugom površinom.

Prije prve uporabe potrebno je aktivirati bočicu. U tu svrhu uklonite čep s pumpe, okrenite bočicu naopako i **pritisnite aplikator nekoliko puta dok se ne pojavi prva kap.**

Informacije za korisnike kontaktnih leća
Proizvod se može koristiti tijekom nošenja kontaktnih leća.

Upute za uporabu:

1. Temeljito operite ruke.
2. Uklonite čep s pumpice (slika 1).
3. Držite pumpicu rukom kao što je prikazano na slici 2.
4. Okrenite bočicu naopako i pritišćite aplikator dok se ne pojavi prva kap (slika 3).
5. S nagnutom glavom prema nazad, pažljivo ukapajte 1 kap u oko (slika 4).
6. Vratite čep na pumpicu.

1. Skinuti čep s pumpice.



2. Obuhvatiti pumpicu sa palcem na čepu i kažiprstom ili malim prstom na dnu bočice.



3. Okrenuti bočicu naopako i pumpicu aktivirati dok se ne pojavi prva kap.



4. Držeći bočicu naopako, pritiskom pumpice ukapati propisan broj kapi u oko.

PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

ROK VALJANOSTI

Otisnut je na pakiranju.
Rok valjanosti nakon otvaranja je 6 mjeseci.
Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

ČUVANJE

Ovaj medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PAKIRANJE

10 ml

DATUM REVIZIJE UPUTE

Kolovoz, 2024.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU

SIMBOL	OBJAŠNJENJE
	Pogledajte Upute za uporabu
MD	Medicinski proizvod
	Proizvođač
	Rok valjanosti
LOT	Broj serije
STERILE A	Sterilno, aseptična tehnika obrade
1	Jedan pacijent, višekratna upotreba
	Ne koristiti oštećeni ili probušeni proizvod
	Upozorenje, pogledajte Upute za uporabu (za važna upozorenja/mjere opreza)
CE	CE oznaka

Dodatni simboli na kutiji:

SIMBOL	OBJAŠNJENJE
	Hidratacija i intenzivna njega u slučajevima mehaničke iritacije i naprezanja očiju
	Dvojaki učinak: ovlaživanje i zaštita blagog do umjerenog suhog oka
	Ublažavanje nelagode i iritacije očiju tijekom nošenja kontaktnih leća
6M	Rok valjanosti nakon otvaranja je 6 mjeseci

MD CE
1304