

STRÅLESKADER

PolyMem standard, PolyMem MAX, PolyMem WIC, PolyMem track, PolyMem silikon

Bruk PolyMem tube bandasje dersom pasienten har tracheostomi. Ved kraftig væskende sår anbefales PolyMem WIC med PolyMem MAX eller absorberende bandasje Curea CCB som sekundærbandasje. Når sekresjonen avtar, går man over til PolyMem MAX, PolyMem standard eller PolyMem silikon. Beskytt sårkantene. Bandasjen byttes når den er 75% mettet.



DONORSTEDER

PolyMem MAX

Legg PolyMem MAX over donorstedet og la den dekke litt utenfor. La den ligge 2-3 dager før den byttes. Bytt tidligere om bandasjen blir mettet til 75%. Deretter byttes ved behov eller etter forordning.



AMPUTASJONER

PolyMem MAX, PolyMem standard, PolyMem silikon

Start med PolyMem MAX da det kan forekomme økt sekresjon. Bytt deretter til PolyMem standard eller PolyMem silikon ettersom sekresjonen avtar. Beskytt sårkantene. Bytt bandasjen når den er mettet 75%.



PILONIDAL CYSTOR

PolyMem WIC, PolyMem MAX

Bruk PolyMem WIC, da denne ikke har noen semipermeabel film og absorberer derfor fra alle kanter. Fyll bare 2/3 av kaviteten ettersom bandasjen ekspanderer litt når den fyller seg. Legg deretter en sekundærbandasje som PolyMem MAX eller absorberende bandasje Curea CCB over. Beskytt omkringliggende hud. Bytt ved behov eller når bandasjen er mettet til 75%.



INDIKASJONER FOR BRUK

PolyMem kan brukes på de fleste sår:

- Trykksår
- Diabetes sår
- Venøse sår
- Arterielle sår
- Donorsteder
- Brannskader
- Overhudskade, overfladiske brannskader
- Diverse dermatologiske lidelser
- Kirurgiske og akutte sår
- Tracheostomier
- Dren, sonde og kateter

31 PARTNERMED

Adresse: Tomteveien 33, 1618 Fredrikstad | Tlf.: +47 94 00 04 74 | E-post: info@partnermed.no

www.partnermed.no

PolyMem®



BEHANDLINGSGUIDE



BEHANDLINGSGUIDE

PolyMem er en unik multifunksjonell bandasje som er designet for å optimalisere og aktivt stimulere sårtilhelingsprosessen. Alle PolyMem bandasjene inneholder Glycerin, surfactant og en superabsorbent som effektivt renser, fyller, absorberer og gir en jevn fuktighet til såret under hele tilhelingsprosessen. Kan sitte på opptil 7 dager.

PolyMem multifunksjonell bandasje stimulerer den autolytiske revisjon, øker væske tilstrømmingen og setter igang en kraftig aktivitet i såret. Dette kan gi økt sekresjon i startfasen av behandlingen, noe som er helt normalt og som er et tegn på at bandasjen fungerer som den skal. Sekresjonen avtar gradvis og såret viser rask forbedring.

Fikser PolyMem med det som passer best for den enkelte pasient, f.eks. en semipermeabel film.



FINGER OG TÅ SKADER

PolyMem finger og tå

Velg rett størrelse og klipp til ønsket lengde. Fjern plast delen i bandasjen og rull fingerbandasjen over finger/tå. Beskytt den friske huden. Bytt når bandasjen er mettet 75%.



OPERASJONSSÅR

PolyMem Surgical, PolyMem Shapes, PolyMem silikon

Disse tre bandasjene er med fiksering. Bytt ved lekkasje eller om det løsner.



BRANNSKADER

PolyMem MAX, PolyMem standard, PolyMem sølv

Start behandlingen med PolyMem MAX da brannskader ofte væsker mye i starten, gå deretter over til PolyMem standard. Ved infeksjon finnes PolyMem standard/sølv og PolyMem MAX sølv. Brannskader er smertefulle. PolyMem reduserer smerten og har dokumentert smertelindrende effekt. Bandasjeskift er enkle og smertefrie og bandasjen fester heller ikke i såret. Beskytt sårkantene. Bytt når bandasjen er mettet til 75%.



INFISERTE SÅR

PolyMem standard, PolyMem MAX, PolyMem WIC, PolyMem sølv

Velg PolyMem MAX ved kraftig væskende sår, PolyMem standard ved mindre væskende sår. Bruk PolyMem WIC ved dype sår eller kaviteter, legg da alltid en sekundærbandasje over, f.eks. PolyMem MAX eller en absorberende bandasje som Curea CCB. Beskytt sårkantene. Bytt når bandasjen er 75% mettet.



DIABETISKE SÅR/ FOTSÅR

PolyMem standard, PolyMem MAX, PolyMem WIC, PolyMem finger og tå

Velg PolyMem MAX ved kraftig væskende sår, PolyMem standard ved mindre væskende sår. Velg PolyMem WIC ved dype sår eller kaviteter, legg da alltid en sekundærbandasje over f.eks. PolyMem MAX eller en absorberende bandasje Curea CCB. Ved skade på Tær, bruke tå bandasjen. Velg rett størrelse og klipp til ønsket lengde. Fjern plastdelen i bandasjen og rull bandasjen over tåen. Inspiser såret etter forordning. Beskytt sårkantene. Bytt bandasjen når den er mettet 75%.



TRYKKSÅR

PolyMem sacral, PolyMem silikon, PolyMem Max, PolyMem standard, PolyMem WIC

Kategori 1: PolyMem standard, PolyMem sacral. For mer avlastning benytt PolyMem MAX. **Kategori 2:** PolyMem MAX. **Kategori 3:** PolyMem WIC for dype sår eller kaviteter, sekundærbandasje PolyMem MAX eller absorberende bandasje Curea CCB. **Kategori 4:** PolyMem sacral, PolyMem MAX eller PolyMem WIC. Velg PolyMem MAX ved kraftig væskende sår, PolyMem standard ved mindre væskende sår. Bruk PolyMem WIC ved dype sår eller kaviteter, legg da alltid en sekundærbandasje over, f.eks. PolyMem MAX eller en absorberende bandasje som Curea CCB. Beskytt sårkantene. Bytt når bandasjen er 75% mettet.



ARTERIELLE SÅR

PolyMem standard, PolyMem MAX, PolyMem WIC, PolyMem silikon

Ved kraftig væskende sår anbefales PolyMem WIC med PolyMem MAX eller Curea CCB som sekundærbandasje. Når sekresjonen avtar går man over til PolyMem MAX og deretter PolyMem standard eller PolyMem silikon. Beskytt sårkantene. Bytt når bandasjen er 75% mettet.



VENØSE SÅR

PolyMem standard, PolyMem MAX, PolyMem WIC, PolyMem silikon

Ved kraftig væskende sår anbefales PolyMem WIC med PolyMem MAX eller Curea CCB som sekundærbandasje. Når sekresjonen avtar går man over til PolyMem MAX og deretter PolyMem standard eller PolyMem silikon. Beskytt sårkantene. Bytt når bandasjen er 75% mettet.

