



Міжнародна шкала оцінювання симптомів передміхурової залози (IPSS)¹

Farmak MedHUB



ПІБ: _____

Дата: _____

Протягом останнього місяця:	Ніколи	Менш ніж 1 раз із 5	Менш ніж у половині випадків	Приблизно у половині випадків	Більш ніж у половині випадків	Майже завжди	Бал
1. Як часто виникало відчуття, що сечовий міхур не спорожнів повністю після сечовипускання?	0	1	2	3	4	5	
2. Як часто виникала потреба мочитися менш ніж через 2 години після завершення сечовипускання?	0	1	2	3	4	5	
3. Як часто під час сечовипускання траплялося зупинятися і знову починати?	0	1	2	3	4	5	
4. Як часто було важко утриматися від сечовипускання при невідкладних позивах до сечовипускання?	0	1	2	3	4	5	
5. Як часто спостерігали слабкий потік сечі?	0	1	2	3	4	5	
6. Як часто виникала потреба напружуватися або тужитися, щоб почати сечовипускання?	0	1	2	3	4	5	

	Не було	1 раз	2 рази	3 рази	4 рази	Більш ніж 5 разів	Бал
7. Скільки разів за ніч доводилось встати для того, щоб помочитися, від початку сну і до ранку?	0	1	2	3	4	5	

Загальний бал: _____

Якість життя через проблеми з сечовипусканням	Задоволений	Досить задоволений	Переважно задоволений	Змішані почуття	Переважно незадоволений	Незадоволений	Жахливо
Якби довелося жити решту життя з нинішнім станом сечовипускання, як би це сприймали?	0	1	2	3	4	5	6

Оцінка результатів опитування:

0–7 балів — легкі симптоми

8–18 балів — помірно виражені симптоми

19 балів і більше — тяжкі симптоми

Використані джерела:

1. International prostate symptom score. Available at: https://www.baus.org.uk/_userfiles/pages/files/Patients/Leaflets/IPSS.pdf (Last access: 17.04.2024).

УКР/НЕПРОМО/12/2025/ФАРМ/НТІ/004

© Медичний портал Фармак, [MedHubFarmak.com](https://www.farmak.com) 2026

