

QUÉ ES LA ABLACIÓN O MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

La ablación o mutilación genital femenina (A/MGF) consiste en el acto de cortar, destruir o eliminar algunas o todas las partes externas de los órganos reproductivos femeninos.

Se calcula que más de 200 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a la A/MGF y que, además, cada año tres millones de niñas son sometidas a esta práctica.

¿POR QUÉ Y DÓNDE OCURRE LA A/MGF?

La A/MGF es una práctica nociva que se viene llevando a cabo desde hace más de 2000 años. La gente suele creer que la A/MGF se realiza por motivos religiosos; sin embargo, la práctica comenzó antes de la aparición de las principales religiones y no la exige ninguna religión.

La explicación de por qué la A/MGF continúa hasta la fecha es compleja. Entre las razones que se dan para realizar esta práctica, se incluyen las siguientes:

- Debido a las expectativas de la familia o la sociedad y para mantener el honor de la familia.
- Por tradición o porque la gente piensa erróneamente que es un precepto religioso.
- Debido a la idea de que protege la virginidad y previene la promiscuidad.
- Para ganarse la aceptación de la comunidad o la sociedad.
- Debido a la falsa creencia de que es mejor para cuidar la limpieza o la higiene.
- Por la idea errónea de que prepara a las niñas para hacerse mujer y que les permite ser feliz en el matrimonio.

La A/MGF ocurre, en su mayor parte, en treinta países de África y Oriente Medio y en algunas regiones de Asia Sudoriental (incluidos Indonesia, India, Malasia y Pakistán), así como en algunas comunidades establecidas en diversos lugares del mundo.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) CLASIFICA LA A/MGF EN CUATRO TIPOS:

TIPO 1

CLITORIDECTOMÍA: resección parcial o total del clítoris (órgano pequeño, sensible y eréctil de los genitales femeninos) y, en casos muy infrecuentes, solo del prepucio (pliegue de piel que rodea el clítoris).

TIPO 2

ESCISIÓN: resección parcial o total del clítoris y los labios menores (los pliegues internos de ambos lados de la apertura de la vagina). Puede incluir la escisión de los labios mayores (pliegues cutáneos externos de la vagina).



TIPO 3

INFIBULACIÓN: estrechamiento de la abertura vaginal a través de un sellado. El sellado se realiza cortando y recolocando los labios menores o mayores y, a veces, cosiéndolos. Puede incluir la resección del clítoris.

TIPO 4

OTROS PROCEDIMIENTOS DAÑINOS: todos los demás procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos, tales como la perforación, la incisión, la ablación, el raspado o la cauterización.

La ablación o mutilación genital femenina (A/MGF) constituye un problema que es necesario revelar y resolver con urgencia.

Para que las comunidades comprendan a fondo los riesgos que esta práctica supone para la salud y el bienestar de millones de niñas y de mujeres, es necesario hablar abiertamente del tema.

Estas páginas le servirán para explicar a las personas de su comunidad los problemas causados por la A/MGF. Si en su comunidad no se practica la A/MGF, le sugerimos apoyar a las organizaciones que luchan por acabar con ella en las zonas donde sí se lleva a cabo.

¿CÓMO AFECTA LA A/MGF A LAS NIÑAS Y LAS MUJERES?


La A/MGF no aporta ningún beneficio para la salud y causa considerables daños.

ENTRE LAS COMPLICACIONES INMEDIATAS, SE INCLUYEN:

- Dolor muy intenso, que a veces provoca el desmayo.
- Sangrado excesivo, que puede causar anemia.

- Infecciones que pueden causar la muerte, como el tétanos y la sepsis.
- Problemas urinarios como consecuencia del dolor intenso o del miedo a ir al baño. Estos problemas pueden causar graves complicaciones de salud.

- Lesiones en las vías urinarias.
- Estado de shock y trauma.
- La muerte, generalmente debido a una infección grave o no tratada, o al sangrado excesivo.



ENTRE LAS CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO, SE INCLUYEN:

- Deformación permanente de las partes genitales femeninas y formación de tejido cicatrizal.
- Numerosas complicaciones durante el parto, como parto prolongado y sangrado excesivo. Este problema puede causar la muerte tanto a la madre como al bebé si no se recibe una atención médica adecuada.

- Problemas durante las relaciones sexuales, como dolor, falta de deseo, sequedad y dificultad para experimentar el orgasmo.
- Desgarros entre la pared vaginal y el recto y/o la vejiga, que pueden causar incontinencia.
- En algunas mujeres, fusión labial, especialmente si se han practicado los tipos 2 y 3 de A/MGF, en que el tejido que rodea la vagina se sella.

- Dificultad para orinar y menstruar, especialmente si se ha practicado una infibulación (tipo 3), que limita el flujo de sangre y orina.
- Consecuencias psicológicas, como el temor constante a las relaciones sexuales, incluso con una pareja a la que se quiere. Algunas sobrevivientes tienen recuerdos recurrentes del momento en que sufrieron la ablación.

Adaptado de los recursos de 28 Too Many (www.28toomany.org), la nota descriptiva de la OMS sobre A/MGF y Revelar, el conjunto de herramientas de Tearfund que aborda temas ocultos. Ver: www.tearfund.org/Reveal/ES