



# silicea

## Vatsa-suolistogeeli



**Akuuttien sekä kroonisten vatsa- ja suolisto-ongelmien myös ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) hoitoon joihin liittyy**

- vatsakipuja
- ilmavaivoja
- pahoinvointia
- ripulia
- oksentelua
- närästystä

**Puhtaasti mineraalinen piigeeli**

**Koostumus**  
 ■ Vaikuttava aine: 100 ml geeliä sisältää 100 ml piigeeliä (piihappogeeliä), jossa on 3,5 g piidioksidia.



### Erityisohjeita

■ Noudata pakkausohjeita. Ravista pulloa ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa!



### Säilytys

■ Älä säilytä yli 25 °C:n lämpötilassa, suojaa jäätymiseltä. Säilytä pullo avaamisen jälkeen jääkaapissa 4 – 8 °C:n lämpötilassa ja käytä se 4 viikon kuluessa.



### Käytettävä ennen / LOT

Katso pakkauksen kansi

### Sisältö

500 ml Geeli

### Valmistaja-Tillverkare

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG  
 D-79236 Ehrenkirchen  
 www.huebner-vital.de

### Markkinoija-Marknadsförare

Oriola Oy  
 PL/PB 8, 02101 Espoo/Esbo  
 www.silicea.fi

■ **Käyttö:** Aikuisille ja lapsille akuutteihin oireisiin 3 – 5 kertaa päivässä 2 mittalusikallista (à 15 ml) sellaisenaan, veteen tai teehen sekoitettuna aterioiden välissä ja tarvittaessa juuri ennen nukkumaanmenoa. Akuuttien oireiden laennuttua valmisteen käyttöä voidaan jatkaa vielä muutamia päiviä annostuksella 3 kertaa päivässä 1 mittalusikka (à 15 ml).

Mikäli kivut ovat voimakkaita, kuume on korkea tai mikäli hoito ei ole tehonnut 3 päivässä, käänny lääkärin puoleen.

Aikuisille kroonisiin oireisiin kertaa päivässä 1 mittalusikka (15 ml) sellaisenaan, veteen tai teehen sekoitettuna aterioiden välissä. Valmistetta voi käyttää kuuden viikon ajan: oireiden pitäisi helpottua 3 viikon käytön jälkeen.

■ Ripulissa on tärkeää korvata nestehukkaa juomalla lisäksi riittävästi. Erityisesti lapsilla nestetasapainosta huolehtiminen on ehdottoman välttämätöntä.

■ Keskustele lääkärisi kanssa käytöstä, mikäli sinulla on lääkitys. Ota lääke 2 tuntia ennen Silicea vatsa-suolistogeelin ottamista tai 2 tuntia sen jälkeen, sillä muuten se saattaa vaikuttaa lääkkeen tehoon.

Terveystieteiden  
 laitteen ja  
 tarvikkeet

CE 0297

# Mag-Tarm Gel



# silicea

## Mag-Tarm Gel



**För behandling av akuta och kroniska mag-tarm problem samt mot irriterabel tarm syndrom (IBS), som orsakar**

- ont i magen
- gasbildning
- illamående
- diarré
- kräkningar
- halsbränna

**En ren mineralprodukt kiselgel**

**Komposition**  
 ■ Aktiv substans; 100 ml gel innehåller 100 ml kiselgel (kiselstyrigel) med 3,5 g kiselidioxid.



### Särskilda råd

■ Läs bipacksedeln som finns i förpackningen noga. Skaka flaskan före användning. Förvara utom räckhåll för barn.



### Förvaring

■ Förvara aldrig flaskan över 25 °C och skydda mot frost. Förvara öppnad flaska i kylskåp 4–8 °C och använd inom 4 veckor från det att flaskan öppnats.



### Utgångsdatum / LOT

■ Se överst på förpackningen.

### Innehåll

500 ml Gel

### Tillverkare

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG  
 D-79236 Ehrenkirchen  
 www.huebner-vital.de

■ **Användning:** För vuxna och barn med akuta symptom 2 mättskedar (à 15 ml) 3 - 5 gånger per dag som sådan eller blandad med t.ex. vatten eller te. Intag dosen mellan måltider eller före sänggånge. När de akuta symtomen har minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 mättsked (à 15 ml) 3 gånger per dag.

Uppstår kraftig smärta, hög feber eller om behandlingen inte har effekt inom 3 dagar bör läkare uppsökas.

Vid kroniska problem hos vuxna rekommenderas 1 mättsked (15 ml) 3 gånger per dag mellan måltiderna. Silicea Mag-Tarm dosen tas direkt eller blandas i t ex vatten eller te.

■ Vid diarré är det viktigt att kompensera vätskeförlusten genom att dricka mycket vatten. Detta är speciellt viktigt för barn.

■ Konsultera din läkare om du använder mediciner. Annan medicin bör tas två timmar före eller efter det att man tar Silicea Mag-Tarm Gel för att inte effekten av medicinen skall påverkas.

Produkt för  
 hälso- och  
 sjukvård.

CE 0297