

Bonnes pratiques de manipulations sur Chambre à Cathéter Implantable



CHP
BREEST
PASTEUR

A destination de votre infirmier(e) libéral(e)

Pour toutes manipulations sur CCI, porter un masque et faire porter un masque au patient.

Pose d'une aiguille :

- 1 - Retirer** l'anesthésiant local (le cas échéant) avec une compresse sèche
- 2 - Réaliser la préparation cutanée du site de pose :**
 - Pratiquer une désinfection large du site avec une compresse stérile imbibée d'**antiseptique alcoolique**
 - Attendre le séchage spontané. **Ne pas essuyer**
 - Renouveler l'application avec une nouvelle compresse **stérile**
 - Attendre le séchage spontané. **Ne pas essuyer**
- 3 - Réaliser une désinfection des mains par friction**
- 4 - Enfiler des gants stériles**
- 5 - Monter** le prolongateur sur l'aiguille si nécessaire, la tubulure, le flacon..., et **purger** l'ensemble
- 6 - Piquer** dans la Chambre à Cathéter Implantable
- 7 - Vérifier** le bon fonctionnement du dispositif (reflux veineux, suivi d'un **rinçage pulsé**)
- 8 - Poser** le pansement stérile, de préférence transparent et semi-perméable
- 9 - Retirer** les gants et **réaliser une désinfection des mains par friction**



Retrait d'une aiguille :

- 1 - Enfiler** des gants non stériles
- 2 - Retirer** le pansement
- 3 - Rincer** la Chambre à Cathéter Implantable avec 10 ml de NaCl à 0,9% de manière pulsée par poussées successives
- 4 - Retirer** l'aiguille en pression positive, en utilisant une pince de retrait si l'aiguille n'est pas sécurisée ; comprimer légèrement avec une compresse stérile imbibée d'**antiseptique alcoolique**
- 5 - Éliminer** l'aiguille immédiatement dans un collecteur à **Objets Piquants Coupants Tranchants**
- 6 - Désinfecter** en badigeonnant le site de ponction avec une compresse stérile imbibée d'**antiseptique alcoolique**
- 7 - Recouvrir** d'un pansement stérile occlusif (à garder 24 heures)
- 8 - Retirer** les gants et **réaliser une friction hydroalcoolique des mains**



“ Pour une prise en charge coordonnée entre la ville et le CHP Brest ”

Références bibliographiques :

- Recommandations du RHC CPias 2021
- Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux - SF2H 3/2012

Contact

(selon prise en charge)

Service de chimiothérapie ambulatoire
du lundi au vendredi de 8h à 18h au 02.98.31.31.26
ou en dehors de ces horaires
le service d'oncologie au 02.98.31.30.42.

HAD du Ponant : 02.98.31.30.64

Services joignables via



Pour y accéder envoyer une demande sur
www.elsan.care/fr/chpb-keradren/chpb-pandalab

SF 4.1.126 version du 22/06/22