

LES INDICATEURS POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE ET LA SECURITE DES SOINS (IQSS) - 2021

Infection associées aux soins

Intitulé	Description	Résultat	
Indicateur de consommation de produits hydro alcooliques (ICSHA.3)	Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains	103/100	A
Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2)	Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de l'établissement de santé dans une démarche visant à optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques	77/100	B
Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2)	Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l'établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre	91/100	A
Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO)	Cet indicateur évalue l'organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l'établissement	96/100	A
Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactérie multi-résistantes (BMR)	Cet indicateur évalue l'organisation, les moyens et les actions mis en place par l'établissement pour maîtriser la diffusion des BMR	100/100	A

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins

Lettre de liaison à la sortie d'une hospitalisation MCO	Cet indicateur, évalue la qualité du courrier de fin d'hospitalisation et son délai d'envoi	56/100	C
Lettre de liaison à la sortie d'une chirurgie ambulatoire	Cet indicateur, évalue la qualité du courrier à la sortie	60/100	C
Evaluation et prise en charge de la douleur en MCO	Cet indicateur mesure la mise en œuvre de l'évaluation de la douleur avec une échelle et d'une stratégie de prise en charge.	92/100	A
Tenue du dossier d'anesthésie	Cet indicateur évalue la qualité du dossier d'anesthésie	93/100	A

Complications après chirurgie orthopédique

Intitulé	Description	Résultat	
Mesure des Evènements Thrombo-Emboliques (ETE) après pose de Prothèse Totale de Genou (PTG) et/ou Prothèse Totale de Hanche (PTH)	L'indicateur est le ratio standardisé du nombre observé sur attendu d'évènements thrombose emboliques après pose de PTG ou PTH	Dans la norme	
Infections du site opératoire (ISO) 3 mois après pose de PTH et/ou PTG (hors fracture)	L'indicateur est le ratio standardisé du nombre observé sur attendu d'ISO 3 mois après pose de PTH ou PTG (hors fracture)	Dans la norme	

Prévention et prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat

Prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement	Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d'une injection prophylactique d'ocytocine et le contrôle de l'état du placenta ont été notés dans le dossier de la patiente	83/100	B
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l'accouchement	Cet indicateur évalue la surveillance clinique minimale dans les 2 heures qui suivent l'accouchement et l'examen autorisant la sortie de la patiente de la salle de naissance	53/100	C
Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat	Cet indicateur évalue si l'heure du diagnostic, le volume de sang perdu et la réalisation d'au moins un geste endo-utérin sont notés dans le dossier de la patiente	38/100	C