

Nom du Porteur de projet	Spécialité	Etablissement du porteur de projet	Titre de l'étude
Franck REMY	Chirurgie orthopédique	Clinique de Saint-Omer	Mid- to long- term outcomes of isolated patellofemoral arthroplasty using a lateral parapatellar approach.
Jérôme GARRET	Chirurgie orthopédique	Clinique du Parc	Innocuité et fiabilité de la libération du nerf médian au canal carpien sous échographie pour le traitement du canal carpien.
Maxime ANTONI	Chirurgie orthopédique	Clinique de l'Orangerie	Précision d'un système de navigation per-opératoire en réalité mixte pour la mise en place de l'implant glénoïdien des prothèses d'épaule
Stanislas BATAILLE	Néphrologue	Clinique Bouchard	VITADIAL : La correction du taux plasmatique de 25-OH vitamine D des patients hémodialysés par la supplémentation en cholécalciférol améliore-t-elle la force musculaire ?
Emmanuelle MALHOMME	Oncologue	Clinique du Fief de Grimoire	Etude randomisée, comparative visant à évaluer la valeur ajoutée de la logothérapie dans l'accompagnement psychologique de la patiente atteinte d'un primo cancer du sein
Martial MATINGOU	Urgentiste	Clinique Esquirol St Hilaire	Apport de l'IA sur la prise en charge aux urgences des patients avec suspicion de fracture osseuse versus une prise en charge traditionnelle sur le taux de réadmission.

Otman SANDALI	Chirurgien Ophtalmologiste	Hôpital Privé Guillaume de Varye	Effet de la réduction de l'intensité lumineuse avec le système de visualisation 3D (NGenuity) durant la chirurgie de la cataracte sur la fonction maculaire des patients présentant une DMLA précoce ou intermédiaire : ERG comparative
Romain BELMONTE	Chirurgien vasculaire	Clinique Esquirol St Hilaire	Etude comparative de la préparation endo vasculaire de l'obstruction artérielle calcifiée du trépied fémoral par utilisation de la technique de fragmentation Shockwave par rapport à la dilatation par ballon simple.
Marin GUY	Kinésithérapie	Hopital Privé St-Martin	Évaluation de l'intérêt médical d'un programme de rééducation pluridisciplinaire intégrant une application mobile en comparaison à une prise en charge par kinésithérapie seule chez les patients présentant une lombalgie à risque de chronicisation.